



**IXUS®**

**Fipronil 5% SC**  
(Systemic and Contact Insecticide)

**Read enclosed leaflet before use. Chemical Composition:** Wetting agent Naphthalene sulfonate: 3.00 % w/w, Suspending agent Sodium Ligno sulphonate: 8.00 % w/w, Sticking/Stabilizing agent: Carboxy Methyl Cellulose 4.00 % w/w, Dispersing agent Sodium salt of Dinaphthyl methanol sulphonic acid: 3.00 % w/w, Blend of emulsifiers (Proprietary blend of alkyl phenol ethoxylate, triglyceride ethoxylate, calcium alkyl benzyl sulphonate): 8.00 % w/w, Water: Q.S. % w/w, Fipronil, A.I. (Minimum purity 90%): 5.00 % w/w, Sunflower oil: 5.00 % w/w, **Total: 100 % w/w.** **Direction Of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuff container and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat, and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **First Aid:** Please see enclosed leaflet. **Symptoms:** Please see enclosed leaflet. **Recommendations:** Fipronil 5% SC is an insecticide which is used to control insects like Stem Borer, Brown Plant Hopper, Green Leaf Hopper, Rice Leaf Folder, Rice Gall Midge, White Backed Plant Hopper and Whorl Maggot etc. in Rice, Diamond Back Moth in Cabbage, Thrips, Aphid, Fruit Borer in Chilli, Early Root & Shoot Borer of Sugarcane and Aphids, Jassids, Thrips, White fly & Boll Worm in Cotton crop. **Caution:** 1. Not to be used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area refer to the leaflet.

**इक्सस**

**फिप्रोनिल ५% एस. सी.**  
अंतरप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक

**उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना:** वेटींग एजेंट नैफ्थालीन सल्फोनेट: ३.०० % भार/भाग, सस्पेंडिंग एजेंट लीग्नोसल्फोनेट: ८.०० % भार/भाग, स्टिकिंग/स्टैबिलाइजिंग एजेंट कार्बोक्सीमिथिल सेल्यूलोज: ४.०० % भार/भाग, डिस्पर्सिंग एजेंट सोडियम लैग्नोसल्फोनेट: ८.०० % भार/भाग, एम्युल्सिफायर (प्रोप्रायटरी ब्लेंड ऑफ़ एल्किल फेनॉल एथोक्सीलेट, ट्रिग्लिसरिड एथोक्सीलेट, कैल्शियम एल्किल बेन्जिल सल्फोनेट): ८.०० % भार/भाग, पानी: क्वॉ.सी. % भार/भाग, फिप्रोनिल ए.आई.: ५.०० % भार/भाग, सूर्यमुखी तेल: ५.०० % भार/भाग, कुल: १००% भार/भाग. **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इस्तेमाल करने से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. खतरनाक, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, आँखों, त्वचा को संपर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वायु को साँस द्वारा अन्दर नलने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद स्तूपित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। सफ़ागुदुसुर इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **लक्षण:** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **उपयोग:** फिप्रोनिल ५ प्रतिशत एस.सी. कीटनाशक धान पर होने वाले नाना रेंडक, धुरा नाना रेंडक, हरी पत्ती का फुटका, धान का पना लोपटक, गाल मित्र, सफेद पीट वाला पीध फुटका, गोम की मक्खी, बंगोभी के होंवा पीठ परलगा, मिर्चों का चुवा, माहु, फल रेंडक, पन्ना के अट्टिया नना व जड़ रेंडक व कणम के चुवा, तेल, माहु, सफेद मक्खी व सोडे की सूड़ी आदि कीटों की रोकथाम में प्रभावकारी है। **चेतावनी:** १) लेवल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें। २) फसल कटौत के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल ना करें। ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट करें। ४) पानी हाइमिस और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए पत्रक देखें।

**इक्सस**

**फिप्रोनिल ५% एस. सी.**  
अंतरप्रवाही अने स्पर्शीय कीटनाशक

**उपयोग करत पढिका पत्रिका वांचो। रासायणीक संयोजन:** फिप्रोनिल सडिय तत्व ( वधुतम शुध्दता ९०%): ५.००% व/व, सूर्यमुभी तेल: ५.००% व/व, वेटींग घटक (नेपथिलीन सल्फोनेट): ३.००% व/व, सस्पेन्डिंग घटक (सोडियम विप्रोसल्फेट): ८.००% व/व, स्ट्रीडींग, स्टेबिलाइजिंग घटक (डायफेन्सिल मिथाइल सेल्सुलोस): ४.००% व/व, डिस्पर्सिंग घटक (डायनेमिथाइल मेथानोव सल्फोनिड असेटेट) सोडियम सोल्फो: ३.००% व/व, एम्युल्सिफायरन् मिश्रण (अल्कोल डिनोव अथोक्सीलेट, ट्रायबेसिलराईड अथोक्सीलेट डेब्रियम अल्कोल व्हेन्सोईल सल्फोनेट): ८.००% व/व, पाणी: क्वॉ.सी. मात्रा, कुल: १००.००% व/व. **उपयोग माटे निर्देश:** कृषा करीने उपयोग करत पढिका आ साथे आपोव पत्रिका वांचो जाव. **प्रयोगकर्तांचो माटे सावधानी:** १. जाहय पदार्थ, जाध पदार्थना जावी वासणी अने पशु आहारशी दूर रावो. २. मी, आंभो अने यामडी साथे संपर्क टाणो. ३. छेडकावना बिंदु खासमां जतां टाणवा. पवननी दिशांमां छेडकाव करो. ४. छेडकाव पछी दूषित कपडे अने शरीरना भागो संपुर्णपधे धोवा. ५. छेडकाव करतमान धूम्रपान के जावा पीवाची क्रिया ना करवी. ६. टावण भनवाची अने छेडकाव दरम्यान संपुर्ण रक्षात्मक कपडे पहडो. **जेरुनुं मारण:** जेरुनुं जाड जाडकस मारण ध्याननाची वक्षणी ट उपयार करो. **प्राथमिक सावरार अने वक्षणी:** इपवा साथे आपोव पत्रिका जुओ. **बवाभवा:** फिप्रोनिल ५% एस. सी. अक जतनाशक छे जे डानरमां गालमाराची छण, लुभरां सुसिया, पालनां बीवां सुसिया, पान वाणनारी छण, जोव मोख, सडेक पीठावा सुसिया, लव मेण्ट, कोबीजनी हीरा सुसिया छण, मरयोमां मोवो, श्रिस अने इण जानार छण, शेडीमां शरुआतनी इम तेम ज मूण कोरनार छण, कपासमां मोवो, ततडियां, श्रिस, सडेक मापी अने छेडवानी छणना निर्देश माटे वापरी साकाय. **सावधानी:** १. वेभव माळिनी पत्रिकांमां आपोव पाक अने जूवात सियाय अन्व कोड पाक के जूवात माटे उपयोग करवो नवी. २. पाकनी कापणी पछी पाकनी जणवणी माटे आनी उपयोग न करवो. ३. माळिनी पत्रिकांमां आपोव सूचना भुजव जावी डळ्याथोनी नाश करो.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

इक्सस

इक्सस

**IXUS®**  
**Fipronil 5% SC**

**इक्सस**

फिप्रोनिल ५% एस. सी.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN  
काराडिनी पढोइपणी दूर रावो

जहर  
POISON  
अरे

बच्चों को पहुँच से दूर रखिए



**SYSTEMIC AND CONTACT INSECTICIDE**  
अंतरप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक

Net Content 1 Ltr.  
शुध्द मात्रा १ ली.



Regn. No. : CIR-228081/2022-Fipronil (SC) (442)-1188  
पंजी. नं. / रजि.नं.: सीआयआर-२२८०८१/२०२२-फिप्रोनिल (एस सी) (४४२)-११८८  
Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187  
उत्पादन लाइसेंस नं. / उ.जा.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

**Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,**  
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanaigri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता एवं विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सान्ताक्रुज (पू.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

**Factory :** G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli, Dist.-Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाद-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

Batch No. / बैच नं. / जेथ नं.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :  
उत्पादन तारीख:

Exp. Date / समापन तिथि :

अपदी सभासिनी तारीख:  
Maximum retail price ₹:

inclusive of all taxes  
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :

सभी करों सहित  
वधुमां वधु शिटेव किंभंत रः  
करपेरा साथे

Unit Sale price per ml

Net Content : 1 Ltr.

शुध्द मात्रा : १ ली.

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address,  
Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Registered Trademark



FOR AGRICULTURAL USE. कृषि उपयोग के लिए।



HDPE Bottle 1 Ltr Size 281mm x 140mm







