

Label 1Ltr (Size: 282mm x 140mm)

JASTER® Paclobutrazol 23% SC Plant Growth Regulator

Read enclosed the leaflet before use. **Chemical Composition:** Paclobutrazol a.i.: 23.00% w/w, Alkylated Naphthalene sulphate sodium salt: 3.00% w/w, Xanthan gum: 0.03% w/w, Sodium bentonite/Aluminium Silicate: 2.50% w/w, Polydimethyl siloxanes + silica: 0.3% w/w, Benzisothiazolin-3-one: 0.01% w/w, Propylene glycol: 5.00% w/w, Water: QS w/w, **Total: 100% w/w.** **Crop group:** For use as a plant growth regulator in mango plant. For dosage and details, see enclosed leaflet. **Direction of Use:** Recommended for mature mangoes plant only (at least 7 years old). Take recommended quality of Paclobutrazol to be diluted in clean water of (5-10 litres) and applied in furrow 5 cm to 10 cm deep, about 30 cm away from the trunk. Fill up with soil after application or apply as soil-collar drench. Wear protective clothing, head dress and face mask. **Precautions:** 1. Keep out of the reach of the children, 2. Wear protective gloves when handling the concentrate, 3. Do not smoke, drink, or eat while using the product, 4. Wash concentrate from skin or eyes immediately, 5. Wash hands and exposed skin before meals and after work, 6. Do not contaminate ponds, water ways or ditches with chemicals or used container, 7. Keep in original container, tightly closed in a safe place. **Antidote:** Treat symptomatically. **First Aid:** Induce vomiting by trickling the back of throat. Medical treatment: If ingested give gastric lavage with care to prevent aspiration. **Symptoms:** Nervousness, anxiety, tremors convulsions and allergic manifestations. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

जरस्टर पैक्लोब्यूट्राजोल २३% एससी पौध विकास नियंत्रक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: पैक्लोब्यूट्राजोल सक्रिय तत्व : २३.००% भार/भार, अल्काइलेटेड नेफथलीन सल्फोनेट सोडियम लवण: ३.००% भार/भार, जैन्थेन गम: ०.०३% भार/भार, सोडियम बेंटोनाइट / एल्यूमीनियम सिलिकेट: २.५०% भार/भार, पॉलीडिमिथिलसिलॉक्सन + सिलिका: ०.३% भार/भार, बेंजिसोथियाजोलिन-३-वन: ०.०१% भार/भार, प्रोपीलीन ग्लाइकोल: ५.००% भार/भार, पानी: पर्याप्त मात्रा भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। **फसल समूह:** आम में पौध विकास के लिए इस्तेमाल होता है। मात्रा एवं विस्तृत जानकारी के लिए संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** केवल परिपक्व आमों के पौधों के लिए (कम से कम सात साल पुराने)। सिफारिश की गई पैक्लोब्यूट्राजोल की मात्रा को ५-१० लीटर साफ पानी में मिलाएँ और तने से ३० सेमी दूरी, ५-१० सेमी गहरी नाली खोद कर प्रयोग करें। प्रयोग के बाद मिट्टी से ढक दें या तने के चारों ओर अच्छी तरह से ढालकर पूरी तरह भिगा दें। पूर्ण सुरक्षात्मक कवच पहनें, सिर व मुँह को ढककर रखें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. बच्चों की पहुँच से दूर रखें। २. संग्रहण स्थल का प्रयोग दुकानें बंद कर दें। ३. प्रयोग के समय धूम्रपान न करें और न ही कुछ खाएँ पीएँ। ४. रसायन को तब तक व आँखों पर से तुरंत धो दें। ५. प्रयोग के बाद आँखों से पहले हाथ और खुली त्वचा को धो लें। ६. नाली तलाबी तथा पानी के स्त्रोतों को प्रयोग किए गए खाली डिब्बों और रासायनिक तत्व से दूषित न करें। ७. कौटनाशक को मूल डिब्बों में ही सुरक्षित जगह पर बंद कर दें। **विष नाशक:** लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** गले में उमली डालकर उल्टी कराएँ। यदि निगल गया हो तो अमाशय साफ करें (मेडिकल लावेज)। ध्यान रखें कि बाहर आ रहे तत्व उच्छवास के साथ अन्दर न जा पायें। **लक्षण:** स्नायुदुर्बलता, व्यग्रता, कम एवं एलर्जी के लक्षण। **सावधानियाँ:** १. इस लैबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।

जरस्टर पैक्लोब्यूट्राजोल २३% एससी छोड़ विकास नियंत्रक

उपयोग करने में पहले बिक्रेते के कृषिपत्रक पढ़ें। रासायनिक संरचना: पैक्लोब्यूट्राजोल सक्रिय तत्व : 23.00% भार/भार, आल्काइलेटेड नेफथलीन सल्फोनेट सोडियम लवण : 3.00% भार/भार, जैन्थेन गम : 0.03% भार/भार, सोडियम बेंटोनाइट/अल्युमिनियम सिलिकेट : 2.50% भार/भार, पॉलीडिमिथिलसिलॉक्सन + सिलिका : 0.3% भार/भार, बेंजिसोथियाजोलिन-3-वन : 0.01% भार/भार, प्रोपीलीन ग्लाइकोल : 5.00% भार/भार, पानी : पर्याप्त मात्रा भार/भार, कुल : 100.00% भार/भार। **फसल समूह:** केरीना पाकमां छोड़ विकास नियंत्रक तैयार उपयोग के लिए। मात्रा एवं विस्तृत जानकारी के लिए संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** आमों के पौधों के लिए (कम से कम सात साल पुराने)। सिफारिश की गई पैक्लोब्यूट्राजोल की मात्रा को 5-10 लीटर साफ पानी में मिलाएँ और तने से 30 सेमी दूरी, 5-10 सेमी गहरी नाली खोद कर प्रयोग करें। प्रयोग के बाद मिट्टी से ढक दें या तने के चारों ओर अच्छी तरह से ढालकर पूरी तरह भिगा दें। पूर्ण सुरक्षात्मक कवच पहनें, सिर व मुँह को ढककर रखें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** 1. बच्चों की पहुँच से दूर रखें। 2. संग्रहण स्थल का प्रयोग दुकानें बंद कर दें। 3. प्रयोग के समय धूम्रपान न करें और न ही कुछ खाएँ पीएँ। 4. रसायन को तब तक व आँखों पर से तुरंत धो दें। 5. प्रयोग के बाद आँखों से पहले हाथ और खुली त्वचा को धो लें। 6. नाली तलाबी तथा पानी के स्त्रोतों को प्रयोग किए गए खाली डिब्बों और रासायनिक तत्व से दूषित न करें। 7. कौटनाशक को मूल डिब्बों में ही सुरक्षित जगह पर बंद कर दें। **विष नाशक:** लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** गले में उमली डालकर उल्टी कराएँ। यदि निगल गया हो तो अमाशय साफ करें (मेडिकल लावेज)। ध्यान रखें कि बाहर आ रहे तत्व उच्छवास के साथ अन्दर न जा पायें। **लक्षण:** स्नायुदुर्बलता, व्यग्रता, कम एवं एलर्जी के लक्षण। **सावधानियाँ:** 1. इस लैबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। 3. पत्तों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।

जरस्टर पैक्लोब्यूट्राजोल २३% एससी

JASTER®

Paclobutrazol 23% SC

जरस्टर पैक्लोब्यूट्राजोल २३% एससी

Keep out of the reach of children
बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

**खतरा
DANGER
भय**

घर/दुकान की पहुँच से दूर रखें।

PLANT GROWTH REGULATOR
पौध विकास नियंत्रक

Net Content 1 Litre
शुद्ध मात्रा १ लीटर




ALBAUGH®
your alternative

Regn. No.: CIR-230082/2022-Paclobutrazol (SC) (442)-73
 रजि. नं.: सीआईआर-२३००८२/२०२२-पैक्लोब्यूट्राजोल (एससी)(४४२)-७३
 Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
 उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
 Manufactured & Marketed By :
 M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
 निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), हॉंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
 Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
 फॅक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 18003000335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No.:
 बैच नं.:
 Batch No.:
 बैच नं.:
 Exp. Date:
 उत्पादन तिथि:
 उत्पादन तिथि:
 उत्पादन तिथि:
 Exp. Date:
 समाप्त तिथि:
 अस्थायी स्थापित की तिथि:
 Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
 अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹
 यद्यपि यद्युक्त किंमत इच्छेता साथे भारतीय मुद्रा में : ₹
 Unit sale price : ₹

Net Content 1 Litre शुद्ध मात्रा १ लीटर
 ®-Registered Trademark
 Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे

 Keep in dry place away from open heat or open flame.
 सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
 For Agriculture Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिए।
 Imitation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 110 C PANTONE 209 C

'A' watermark 10% of base color

Label Size 500ml (Size: 229mm x 110mm)

JASTER[®] Paclobutrazol 23% SC Plant Growth Regulator

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Paclobutrazol a.i.: 23.00% w/w, Alkylated Naphthalene sulphonate sodium salt: 3.00% w/w, Xanthan gum: 0.03% w/w, Sodium bentonite/Aluminium Silicate: 2.50% w/w, Polydimethyl siloxanes + silica: 0.3% w/w, Benzisothiazolin-3-one: 0.01% w/w, Propylene glycol: 5.00% w/w, Water: 65% w/w. **Total: 100% w/w. Crop group:** For use as a plant growth regulator in mango plant. For dosage and details, see enclosed leaflet. **Direction of Use:** Recommended for mature mangoes plant only (at least 7 years old). Take recommended quality of Paclobutrazol to be diluted in clean water of (5-10 litres) and applied in furrow 5 cm to 10 cm deep, about 30 cm away from the trunk. Fill up with soil after application or apply as soil-collar drench. Wear protective clothing, head dress and face mask. **Precautions:** 1. Keep out of the reach of the children. 2. Wear protective gloves when handling the concentrate. 3. Do not smoke, drink, or eat while using the product. 4. Wash concentrate from skin or eyes immediately. 5. Wash hands and exposed skin before meals and after work. 6. Do not contaminate ponds, water ways or ditches with chemicals or used container. 7. Keep in original container, tightly closed in a safe place. **Antidote:** Treat symptomatically. **First Aid:** Induce vomiting by trickling the back of throat. Medical treatment: If ingested give gastric lavage with care to prevent aspiration. **Symptoms:** Nervousness, anxiety, tremors convulsions and allergic manifestations. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

जस्टर पैक्लोब्यूट्राजोल २३% एससी पौध विकास नियंत्रक
 उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: पैक्लोब्यूट्राजोल सक्रिय तत्व : २३.००% भार/भार, अल्काइलेटेड नेफ्थालीन सल्फोनेट सोडियम लवण: ३.००% भार/भार, जैन्थेन गॉद : ०.०३% भार/भार, सोडियम बेटोनाइट / एल्यूमीनियम सिलिकेट : २.५०% भार/भार, प्रोपिलीन ग्लायकोल : ५.००% भार/भार, पानी: ६५% भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। **कृषि समूह:** आम में पौध विकास के लिए उपयुक्त है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** केवल परिष्कृत आमों के पौधों के लिए (कम से कम सात साल पुराने)। सिफारिश की गई पैक्लोब्यूट्राजोल की मात्रा को ५-१० लीटर साफ पानी में मिलाए और तने से ३० सेमी दूर, ५-१० सेमी गहरी नाली खोद कर प्रयोग करें। प्रयोग के बाद मिट्टी से एक दू दे या तने के चारों ओर अच्छी तरह से डालकर पूरी तरह मिगो दें। पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र पहनें, सिर व मुँह को ढककर रखें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. बच्चों को पहुँच से दूर रखें। २. संभल द्रव्य को प्रयोग दस्तानों पहन कर करें। ३. प्रयोग के समय धूम्रपान न करें और न ही कुछ खाएँ पीएँ। ४. रसायन को त्वचा व आँखों पर से तुरंत धो दें। ५. प्रयोग के बाद और खाने से पहले हाथ और खुली त्वचा को धो लें। ६. नालों तलवों तथा पानी के स्रोतों को प्रयोग किए गए छाती डिब्बों और रासायनिक तत्व से दूषित न करें। ७. कोटादण्ड को मूल डिब्बों में ही सुरक्षित जगह पर व ढक्कन बंद कर रखें। **विष नाशक:** लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** गले में उँगली डालकर उल्टी करवाएँ। यदि निगल गया हो तो अमाशय साफ करें (मैग्नेसियम सल्फेट)। घ्यात रखें कि बाहर आ रहे तत्व उच्छ्वास के साथ अन्दर न जा पायें। **लक्षण:** स्नायुदुर्बलता, व्यंगता, कंपन एवं एलर्जी के लक्षण। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसिंग और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और सुराक पढ़ें।

जस्टर पैक्लोब्यूट्राजोल २३% एससी छोट विकास नियंत्रक
 उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: पैक्लोब्यूट्राजोल सक्रिय तत्व : २३.००% भार/भार, अल्काइलेटेड नेफ्थालीन सल्फोनेट सोडियम लवण: ३.००% भार/भार, जैन्थेन गॉद : ०.०३% भार/भार, सोडियम बेटोनाइट/एल्यूमीनियम सिलिकेट : २.५०% भार/भार, प्रोपिलीन ग्लायकोल : ५.००% भार/भार, पानी: ६५% भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। **कृषि समूह:** आम में पौध विकास के लिए उपयुक्त है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** केवल परिष्कृत आमों के पौधों के लिए (कम से कम सात साल पुराने)। सिफारिश की गई पैक्लोब्यूट्राजोल की मात्रा को ५-१० लीटर साफ पानी में मिलाए और तने से ३० सेमी दूर, ५-१० सेमी गहरी नाली खोद कर प्रयोग करें। प्रयोग के बाद मिट्टी से एक दू दे या तने के चारों ओर अच्छी तरह से डालकर पूरी तरह मिगो दें। पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र पहनें, सिर व मुँह को ढककर रखें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. बच्चों को पहुँच से दूर रखें। २. संभल द्रव्य को प्रयोग दस्तानों पहन कर करें। ३. प्रयोग के समय धूम्रपान न करें और न ही कुछ खाएँ पीएँ। ४. रसायन को त्वचा व आँखों पर से तुरंत धो दें। ५. प्रयोग के बाद और खाने से पहले हाथ और खुली त्वचा को धो लें। ६. नालों तलवों तथा पानी के स्रोतों को प्रयोग किए गए छाती डिब्बों और रासायनिक तत्व से दूषित न करें। ७. कोटादण्ड को मूल डिब्बों में ही सुरक्षित जगह पर व ढक्कन बंद कर रखें। **विष नाशक:** लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** गले में उँगली डालकर उल्टी करवाएँ। यदि निगल गया हो तो अमाशय साफ करें (मैग्नेसियम सल्फेट)। घ्यात रखें कि बाहर आ रहे तत्व उच्छ्वास के साथ अन्दर न जा पायें। **लक्षण:** स्नायुदुर्बलता, व्यंगता, कंपन एवं एलर्जी के लक्षण। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसिंग और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और सुराक पढ़ें।

जस्टर

JASTER[®]

Paclobutrazol 23% SC

जस्टर

पैक्लोब्यूट्राजोल २३% एससी

Keep out of the reach of children.

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

खतरा
DANGER
(मय)

गुणवत्ता परीक्षण के लिए

PLANT GROWTH REGULATOR

पौध विकास नियंत्रक

Net Content **500 ml**

शुद्ध मात्रा **५०० मि.ली.**



ALBAUGH[®]
your alternative

Regn. No.: CIR-230082/2022-Paclobutrazol (SC) (442)-73
 रजि. नं.: सीआईआर-२३००८२/२०२२-पैक्लोब्यूट्राजोल (एससी)(४४२)-७३
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
 उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By:
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कामलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), हॉंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 18003000335, Email: contactin@albaughlc.com

Batch No. :
 बैच नं. :
 वेब द. :

Mfg. Date :
 उत्पादन तिथि :
 Exp. Date :
 विलेखन तिथि :

अवधि समाप्ति तिथि :
 Maximum retail price
 Inclusive of all taxes
 in Indian currency : ₹

अधिकतम खुदरा मूल्य
 सभी करों सहित
 भारतीय मुद्रा में : ₹
 वृषभों व अन्य जीवित जीवों
 के प्रति
 भारतीय रुपयों में : ₹
 Unit sale price : ₹

Net Content **500 ml** शुद्ध मात्रा **५०० मि.ली.**

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.

सूखी और तपछी जगह में आग से दूर रखें।

For Agriculture Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

Limitation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 110 C PANTONE 209 C

'A' watermark 10% of base color

Label Size 250ml (Size: 206mm x 77mm)

JASTER Paclobutrazol 23% SC Plant Growth Regulator

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Paclobutrazol a.i.: 23.00% w/w, Alkylated Naphthalene sulphionate sodium salt: 3.00% w/w, Xanthan gum: 0.03% w/w, Sodium bentonite/Aluminium Silicate: 2.50% w/w, Polydimethyl siloxanes + silica: 0.3% w/w, Benzisothiazolin-3-one: 0.01% w/w, Propylene glycol: 5.00% w/w, Water: QS% w/w. **Total: 100% w/w. Crop group:** For use as a plant growth regulator in mango plant. For dosage and details, see enclosed leaflet. **Direction of Use:** Recommended for mature mangoes plant only (at least 7 years old). Take recommended quality of Paclobutrazol to be diluted in clean water of (5-10 litres) and applied in furrow 5 cm to 10 cm deep, about 30 cm away from the trunk. Fill up with soil after application or apply as soil-collar drench. Wear protective clothing, head dress and face mask. **Precautions:** 1. Keep out of the reach of the children, 2. Wear protective gloves when handling the concentrate, 3. Do not smoke, drink, or eat while using the product, 4. Wash concentrate from skin or eyes immediately, 5. Wash hands and exposed skin before meals and after work, 6. Do not contaminate ponds, water ways or ditches with chemicals or used container, 7. Keep in original container, tightly closed in a safe place. **Antidote:** Treat symptomatically. **First Aid:** Induce vomiting by tickling the back of throat. **Medical treatment:** If ingested give gastric lavage with care to prevent aspiration. **Symptoms:** Nervousness, anxiety, tremors convulsions and allergic manifestations. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: पैक्लोब्यूट्राजोल सक्रिय तत्व : २३.००% भार/भार, अल्काइलवेल्डेड नेफथलीन सल्फोनेट सोडियम लवण: ३.००% भार/भार, बैन्डेन गॉड : ०.०३% भार/भार, सोडियम बेंटोनाइट / एल्यूमीनियम सिलिकेट: २.५०% भार/भार, पॉलीडायमिथाईल सिलॉक्सान+ सिलिका: ०.३% भार/भार, बेजिसोथियाजोलिन-३-वन: ०.०१% भार/भार, प्रोपीलीन ग्लायकोल: ५.००% भार/भार, पानी: पर्याप्त मात्रा भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। **फसल समूह:** आम में पौध विकास के लिए इस्तेमाल होता है। मात्रा एवं विस्तृत जानकारी के लिए संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** केवल परिष्कृत आमों के पौध के लिए (कम से कम सात साल पुराने)। सिंकारिया को गई पैक्लोब्यूट्राजोल की मात्रा को ५-१० लीटर साफ पानी में मिलाए और तने से ३० सेमी दूर, ५-१० सेमी गहरी भाली खोद कर प्रयोग करें। प्रयोग के बाद मिट्टी से ढक दे वा तने के चारों ओर अच्छी तरह से डालकर पूरी तरह मिगों दें। पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र पहनें, सिर व मुँह को ढककर रखें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. बच्चों को पौध से दूर रखें। २. रोगम तंत्र का प्रयोग दूरतन पत्रक करें। ३. प्रयोग के समय धूपपान न करें और न ही कुछ खायें पीयें। ४. रसायन को त्वचा व आँखों पर से तुरंत धो दें। ५. प्रयोग के बाद और खाने से पहले हाथ और खुली त्वचा को धो लें। ६. नालों तलाकों तथा पानी के स्थलों को प्रयोग किए गए खाली डिब्बों और रसायनिक तत्व से दूषित न करें। ७. कीटनाशक को मूल डिब्बों में ही सुरक्षित जगह पर व ढक्कन बंद कर रखें। **विष नाशक:** लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** गले में उंगली डालकर उल्टी करवाएं। यदि निगल गया हो तो अमाशय साफ करें (मैग्जिक लावेज)। ध्यान रखें कि बाहर आ रहे तत्व उच्छ्वास के साथ अन्दर न जा पायें। **लक्षण:** स्नायुदुर्बलता, व्यग्रता, कंपन एवं एलर्जी के लक्षण। **सावधानियां:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पालीहाउस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।

જસ્ટર ૨૩% SC

JASTER
Paclobutrazol 23% SC

जस्टर
पैक्लोब्यूट्राजोल २३% एससी

खतरा
DANGER
(अध)

PLANT GROWTH
REGULATOR
पौध विकास नियंत्रक

Net Content 250 ml
सुद मात्रा २५० मि.ली.

ALBAUGH
your alternative

Regn. No.: CIR-230082/2022-Paclobutrazol (SC) (442)-73
पं. नं.: सीआईएए-३३००८२/२०२२-पैक्लोब्यूट्राजोल (एससी)(४४२)-७३
Manufacture Lic No.: MLJDDP/2022-23/187 **उत्पादन लाइसेंस नं.:** एएल/केडीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By : **M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,** 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagari Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्मित और विपणनकर्ता : **मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड,** 1७५, कगलवाला हाउस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिंगा, सान्ताक्रुज (ए), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sarwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहरिसल-मवाली, जिला-उदरपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughlic.com

Batch No.:
बैच नं.:
Mfg. Date:
उत्पादन तिथि:
Exp. Date:
इस्तेमाल तिथि:
Maxium retail price
Includes of all taxes
In India (Maximum) : ₹
अधिकतम खुलत मूल्य
एन सी इलुड
एन सी टैक्स
एन सी टैक्स
अधिकतम खुलत मूल्य
एन सी टैक्स
एन सी टैक्स
Net Content 250 ml सुद मात्रा २५० मि.ली.
Registered Trademark
Re-entry: 24 hours पुन-प्रविष्टि : २४ घंटे
Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
For Agriculture Use Only. **केवल कृषि उपयोग के लिए।**
Initiation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 110 C

PANTONE 209 C

'A' watermark 10% of base color

Label Size 100ml (Size: 141mm x 76mm)

JASTER Paclobutrazol 23% SC Plant Growth Regulator

Read enclosed leaflet before use. Chemical Composition:
 Paclobutrazol a.i.: 23.00% w/w. Akylated Naphthalene sulphonate sodium salt: 3.00% w/w. Xanthan gum: 0.03% w/w. Sodium benzoate/Aluminium Silicate: 2.50% w/w. Polydimethyl siloxanes + silica: 0.3% w/w. Benzothiazolyl-s-one: 0.01% w/w. Propylene glycol: 5.00% w/w. Water: 42% w/w. **Total: 100% w/w. Crop group:** For use as a plant growth regulator in mango plant. For dosage and details, see enclosed leaflet. **Direction of Use:** Recommended for mature mangoes plant only (at least 7 years old). Take recommended quality of Paclobutrazol to be diluted in clean water of (5-10 litres) and applied in furrow 3 cm to 10 cm deep, about 30 cm away from the trunk. Fill up with soil after application or apply as soil-collor drench. Wear protective clothing, head dress and face mask. **Precautions:** 1. Keep out of the reach of the children. 2. Wear protective gloves when handling the concentrate. 3. Do not smoke, drink, or eat while using the product. 4. Wash concentrate from skin or eyes immediately. 5. Wash hands and exposed skin before meals and after work. 6. Do not contaminate ponds, water ways or ditches with chemicals or used container. 7. Keep in original container, tightly closed in a safe place. **Antidote:** Treat symptomatically. **First Aid:** Induce vomiting by trickling the back of throat. Medical treatment: If ingested give gastric lavage with care to prevent aspiration. **Symptoms:** Nervousness, anxiety, tremors, convulsions and allergic manifestations. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

जस्टर पैक्लोबूट्राजोल २३% एससी पौध विकास नियंत्रक

उपयोग से पहले संलग्न पत्रक पढ़ें। रासायनिक संघटन: पैक्लोबूट्राजोल सक्रिय तत्व : २३.००% भार/भाग, अयुक्त नैफ्थालेन सल्फोनेट सोडियम लवण: ३.००% भार/भाग, डेनबेन गॉल: ०.०३% भार/भाग, खान्थान गुम: ०.०३% भार/भाग, पॉलीडिमिथिलसिलोक्सन + सिलिका: ०.३% भार/भाग, बेंजोथिआझोल-१-०न-०.०१% भार/भाग, प्रोपिलेन ग्लायकोल: ५.००% भार/भाग, पानी: शेष भाग % भार/भाग, कुल: १००.००% भार / भाग। **फलस समुद्र:** आम में पौध विकास के लिए उपयुक्त फल है। आम पर विरल कणकों के लिए संलग्न पत्रक पढ़ें। **उपयोग के लिए निर्देश-निर्देश:** कलम पौधे आम के पौधे के लिए, आम में आम आम आम आम। **निर्देशिका की मद पैक्लोबूट्राजोल की मात्रा को ५-१० लीटर साफ पानी में घिराए और इसे ३-६ मीटर दूर, ५-१० सेमी गहरी गहरी खुद कर डालें।** प्रयोग के बाद मिट्टी में कम दे पा रहे हैं पानी और उपकी मात्र में कृषक पौधे आम फलों में पुष्प प्रभावण पर न करें, आम व गूँठ को हलक रखें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. बच्चों की पहुँच से दूर रखें। २. खाद आम का प्रयोग करते समय कंधे को ढकें। ३. प्रयोग के समय साफ न कपड़े और न ही कप धुने पैं। ४. खाद आम को खाए व अंडों पर से हाँस धो दें। ५. प्रयोग के बाद और खुरे से पहले हाथ और खुली लवक को धो लें। ६. नाले नलको नला पानी के स्त्रोतों को प्रयोग किए गए काली डिब्बों और सावधानी लव के दूर से न करें। ७. पैक्लोबूट्राजोल को दूर डिब्बों में ही सुरक्षित जगह पर व टाइट बंद कर रखें। **विष मारक:** लक्षणाभार उपचार करें। **प्रायोगिक चिकित्सा:** गले में अम्ली प्रवाहक जड़ी करवाए। यदि मित्र आम से तो अम्लामय सफ कर (मिट्टिक समेक)। **घरवाले कि बचत:** आम गूँठ लव उपवास के बाद अम्ल न न पावे। **सुरक्षा:** सावधानी, साफता, कस पर पहनी के लवण। **सावधानियाँ:** १. इस लवण / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद आम का प्रयोग नहीं करें। ३. पानी पर निर्दिष्ट खुरक से अधिक प्रयोग के बाद पैदावार डिब्बों को कंध न दें। ४. पैक्लोबूट्राजोल और सीमित क्षेत्रों के लिए अत्यधिक मिट्टी और शुष्क पत्तों दें।

१२२२ ४५५६

JASTER[®]

Paclobutrazol 23% SC

जस्टर

पैक्लोबूट्राजोल २३% एससी

Keep out of the reach of children

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

खतरा

DANGER

(भय)

Overall label size (२२ x ७६)

PLANT GROWTH REGULATOR

पौध विकास नियंत्रक

Net Content **100 ml**
शुद्ध मात्रा १०० मि.ली.

ALBAUGH[®]
your alternative

Regn.No: CR-280882022-Paclobutrazol (SC) (442)-73
 रजि. नं. सीआईएम-२३००८४/२०२२-पैक्लोबूट्राजोल (एससी)(४४२)-७३

Manufacture Lic No. MLJDP/2022-23/187
 उत्पादन लाइसेंस नं. एएल/जेडपीसी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By:
Ms. Rohan Crop Protection Pvt.Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyaynagi Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400098.

निर्मित और विकसितकर्ता : श्री. रोहन क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड,
 १७५, कागलवाला हाउस, दूसरी मंजिल, विद्यायनगी मार्ग, कलिना, सांक्रुज (ई), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८

Factory Address: G-155, RICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mevati, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
 कारखाने : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाद-फतेहनगर, मेवती-मण्डली, जिला-उदपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address: Tel: 8100300335, Email: contact@albaughlic.com

Batch No.:
 लि.नं.:
 N/A

Mfg. Date:
 उत्पादन तिथि:
 N/A

Exp. Date:
 काल तिथि:
 N/A

Net Content 100 ml शुद्ध मात्रा १०० मि.ली.

Re-entry: 24 hours पुन.निर्वास: २४ घंटे

Keep in dry places away from open heat or open flame, पृथकी और ठंडी जगह में आम से दूर रखें।

For Agriculture Use Only. **Initiation of label graphics is a punishable offence.**

PANTONE 110 C PANTONE 209 C

‘A’ watermark 10% of base color

Shipper Label Size 100ml (Size: 180mm x 110mm)

JASTER®
Paclobutrazol 23% SC

जरस्टर
पैक्लोबूट्राजोल २३% एससी

खतरा
DANGER
(मृत्यु)

Keep out of the reach of children
बच्चों की पहुँच से दूर रखिये।
गणेशजी गोविंदाई (२२ राभा)

**PLANT GROWTH
REGULATOR**
पौध विकास नियंत्रक

PACKING

Regn. No.: CIR-230082/2022-Padobutrazol (SC) (442)-73
रजि. नं.: सीआईआर-२३००८२/२०२२-पैक्लोबूट्राजोल (एससी)(४४२)-७३
Manufacture Lic No.: MLJDDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By: M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagahwala House, 2nd Floor, Vidyanaigri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता: मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानागरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज (पु.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी: जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहरिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. / बैच नं. / बैच नं.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि:
উৎপাদন তারিখ:
Exp. Date / समापन तिथि:
अवधि समाप्ति तारीख:
Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹:
सभी करों सहित
वधुभां वधु रीटिल किंमत ₹:
इस्येश साथै

© - Registered Trademark
Re-entry: 24 hours पुनः प्रविष्टि: २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें। Imitation of label graphics is a punishable offence.
For Agriculture Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

THIS SIDE UP

PANTONE 110 C

PANTONE 209 C

‘A’ watermark 10% of base color

READ ENTIRE LEAFLET BEFORE USE.

प्रयोग से पहले पूरी पत्रिका ध्यानपूर्वक पढ़ें।

JASTER®

Paclobutrazol 23% SC (Plant Growth Regulator)

जस्टर

पैक्लोब्यूट्राजोल 23% एससी (पौध विकास नियंत्रक)

جسٹر
بيكلوبيوٹرازول 23% ايس سى
(پودوں كى نشونما كو منظم كرنے والا)

اس كے اجزاء ميں بيكلوبيوٹرازول شامل ہے۔ جو اندرونى طور سے يود وں كى نشونما كو منظم كرتا ہے۔ اس كى دريافت مملكت منحدہ كے زنكنا كے نيكو نيا ہے۔ اس كا اصل كلم جبريلين بايوسين تھيسيس كروكنا ہے۔ يہ مركب نئون كى نسيجون اور جڑوں ميں انبلى اصل جگہ جگہ پہنچ كے اپنا كلم كرتا ہے۔ يہ نئى كوئيون كے درمياني فاصلے كو كم كرتے اور اس ميں كلما كرا ہوا ہا۔ نئون شاخاں بيلاكلہ ہيٹيم ۾ ڈبھائے آك كے ڈارميڊيل واڊ بيلاكلہ آخري كلناں اور كوئيونلى جلدى بنا كے پودوں كو نئى توانائى بخشتا ہے۔ اس كا پھل كى پيداوار،، پھل كے رنگ اور فصل كى پيداوار يھى خوشگوار ائثر پڑتا ہے۔	اس كے اجزاء ميں بيكلوبيوٹرازول شامل ہے۔ جو اندرونى طور سے يود وں كى نشونما كو منظم كرتا ہے۔ اس كا اصل كلم جبريلين بايوسين تھيسيس كروكنا ہے۔ يہ مركب نئون كى نسيجون اور جڑوں ميں انبلى اصل جگہ جگہ پہنچ كے اپنا كلم كرتا ہے۔ يہ نئى كوئيون كے درمياني فاصلے كو كم كرتے اور اس ميں كلما كرا ہوا ہا۔ نئون شاخاں بيلاكلہ ہيٹيم ۾ ڈبھائے آك كے ڈارميڊيل واڊ بيلاكلہ آخري كلناں اور كوئيونلى جلدى بنا كے پودوں كو نئى توانائى بخشتا ہے۔ اس كا پھل كى پيداوار،، پھل كے رنگ اور فصل كى پيداوار يھى خوشگوار ائثر پڑتا ہے۔	اس كے اجزاء ميں بيكلوبيوٹرازول شامل ہے۔ جو اندرونى طور سے يود وں كى نشونما كو منظم كرتا ہے۔ اس كا اصل كلم جبريلين بايوسين تھيسيس كروكنا ہے۔ يہ مركب نئون كى نسيجون اور جڑوں ميں انبلى اصل جگہ جگہ پہنچ كے اپنا كلم كرتا ہے۔ يہ نئى كوئيون كے درمياني فاصلے كو كم كرتے اور اس ميں كلما كرا ہوا ہا۔ نئون شاخاں بيلاكلہ ہيٹيم ۾ ڈبھائے آك كے ڈارميڊيل واڊ بيلاكلہ آخري كلناں اور كوئيونلى جلدى بنا كے پودوں كو نئى توانائى بخشتا ہے۔ اس كا پھل كى پيداوار،، پھل كے رنگ اور فصل كى پيداوار يھى خوشگوار ائثر پڑتا ہے۔	اس كے اجزاء ميں بيكلوبيوٹرازول شامل ہے۔ جو اندرونى طور سے يود وں كى نشونما كو منظم كرتا ہے۔ اس كا اصل كلم جبريلين بايوسين تھيسيس كروكنا ہے۔ يہ مركب نئون كى نسيجون اور جڑوں ميں انبلى اصل جگہ جگہ پہنچ كے اپنا كلم كرتا ہے۔ يہ نئى كوئيون كے درمياني فاصلے كو كم كرتے اور اس ميں كلما كرا ہوا ہا۔ نئون شاخاں بيلاكلہ ہيٹيم ۾ ڈبھائے آك كے ڈارميڊيل واڊ بيلاكلہ آخري كلناں اور كوئيونلى جلدى بنا كے پودوں كو نئى توانائى بخشتا ہے۔ اس كا پھل كى پيداوار،، پھل كے رنگ اور فصل كى پيداوار يھى خوشگوار ائثر پڑتا ہے۔
--	--	--	--

سفرارش:

فصل	ڪيڑوں كا عام نام	خوراڪ اڀيڪڙ	پاني ميں انتظارى مدت
		اے اُنكى محلول	آخرى ڇيڙڪاڙ سڙڪڻى تڪ (نئون ميں)

ام يا ڀيڙ	عمر 7-15 سال	-	15 مللى ليٽر	-
	عمر 16-25 سال	-	20 مللى ليٽر	-
	عمر 25 سال	-	25-40 مللى ليٽر	-

زيدہ عمر كے

طريقہ استعمال:

سفرارش صرف پختہ شدہ امون كے لئے (كم از کم 7 سال برائے ام)۔ بيكلوبيوٹرازول كى سفرارش كردہ مقدار كو 10-15 ليٽرو صاف پاني ميں ڪوئيون اور نئى سے 30 سيٽي ميٽرڊور 5 سے 10 سيٽي ميٽر ڳيرى نالي ڪهوء ڪراس كا استعمال ڪريون – استعمال ڪرڻ بعد نالي ڪوبهر دين يا اسے نئون مائيٽي-ڪلنبا ٽرئڪھ هياڻ ڀڄو ڀڄو ڀڄو ڀڄو

ڪے ڇاڙو طرف اچھى طرح ڏال ڪے پوري طرح بيھگويون –

استعمال كا وقت:

فصل توڙي نئى بعد اس كا استعمال ڪريون۔ اس كے استعمال كا بھترين وقت جولائى سے اڪٽوبر تک پوتا ہے۔

احتياط:

- اسے بچو ڪى رسائى سے دور ڪريھن۔
- اس ڪيھول استعمال ڪرڻے وقت حفاظتى دستاڻے پنيون۔
- اس پروٽڪٽ ڪو استعمال ڪرڻے وقت ڪھائے پيئڻے اور بيٺى سگريٽ سے پري بيز ڪريون۔
- استعمال ڪے فور بعد اولدھ جلد اور نڪتون ڪو اچھى طرح دهلين۔
- استعمال ڪے بعد اور ڪھائے سے قبل پنهائون اور اولدھ جلد ڪواچھى طرح دهلين۔
- تالاب، نالون اور ڪھنائيون ڪو ڪيميڪلز اور استعمال شدہ ڏٺيون سے اولدھ نہ ڪريون۔
- ايڪ سھڪيٽ حداثت ھياڻ ۾ ھياڻ بنا ڇوڪري ڪھڻا ڪھڻا نہ ڀڄيڻ ڄاڻيڻ ڀڄيڻ ڄاڻيڻ ڀڄيڻ ڄاڻيڻ
- اس پروٽڪٽ ڪواچھى طرح سر پيٺہ اصل ڏٺيون ميں محفوظ جگھون ميں ڪريھن۔

زير ڪي علامت:

بد حواسى، بے چيني، ڪيڪي، رعشہ اور الرجى ڪے ائثر۔

ابتدائى طبي امداد:

گردن پريٺڪى ضرب لڱا ڪے ڦٽي ڪرائين۔ طبي علاج: اگر ننگل ليايونيواسے گيٽرڪ لاويج دين۔ اس بات كا خيال رڪهيون ڪه بائرن ڪنھن واپادھ دوبارہ اندر نہ ڄائے پائے۔

پودوں كى سميت:

بٽائي گئى مقدار ڪے طريقے سے استعمال ڪرڻے ڀر يہ پودوں ڪے لئے زير لا نهين ٿيے۔

ترياق:

علامت ڪے مطابق علاج ڪريون –

استعمال شدہ ڏٺيون ڪو ضائع ڪرڻا:

- استعمال شدہ ڏٺيون ڪوڪٽ ڪے يا توڙي اڪي ابيدى سر دور دفن ڪريديون۔
- استعمال شدہ ڏٺيون ڪوبائرن ڇھوڙين ناڪنہ ان كا دوبارہ استعمال نہ پون۔
- ڏٺيون، فاضل مواد اور دھن ڪو محفوظ طور سے اس طرح ضائع ڪريون ڪنہ اس سے ماحوليات اور پائي اولدھ نہ پون۔

اسٽور ڪرڻے كى شرانظ:

- پودوں كى نشو ونما ڪو منظم ڪرڻے والے مواد ڪو ان ڪے اصل ڏٺيون ميں الڳ ڪمرے يا مڪان ميں دوسرے سامان رڪھڻے ڪي جڳہ سے دور رڪھيڻ يا الڳ المارى ميں ٽالڻ چاهي سے بند ڪرڻے رڪھيون۔
- پودوں كى نشوونما ڪو منظم ڪرڻے والے مواد ڪو اچھى طرح بنه پوئے روشن، پووار اور ڪشاده مڪان ميں رڪھيون۔

ڪيميائى اجزائے ڪي ڪيمبي:

بيكلوبيوٹرازول فعال مادہ	23.00%	ڏٺيُو / ڏٺيُو
الڪالئ نيٽرين سلفونيٽ	3.00%	ڏٺيُو / ڏٺيُو
سوڊيم سالٽ		
اڪرائئم گونڊ	0.03%	ڏٺيُو / ڏٺيُو
سوڊيم بيٽونائٽ/ الو مينيم سيلبي ڪيٽ	2.50%	ڏٺيُو / ڏٺيُو
پولي ڌيمي ٽھائيل سيلوڪسيفنز + سيلنيڪا	0.3%	ڏٺيُو / ڏٺيُو
بنيڙائى سونيٽريا زولين – 3- و ن	0.01%	ڏٺيُو / ڏٺيُو
پروپلين گلائي ڪول	5.00%	ڏٺيُو / ڏٺيُو
پاني	QS	ڏٺيُو / ڏٺيُو
ٽوٽل:	100.00%	ڏٺيُو / ڏٺيُو

نوٽوننگ:
1- اس كا استعمال صرف انھيون فصلون اور ڪيڙيون پري ڪريون جن كا ڏنڪرين يا پرڄي ميں ڪيا گيا ٿو۔ 2- فصل كى ڪٽائى ڪے بعد اس كا استعمال نہ ڪريون۔ 3- پرڄي ميں دئى گئى ڊبايت ڪے مطابق خالي ڏٺيون ڪو ضائع ڪرڻ دين۔ 4- پولي اوريٺڊ مڪنون ڪے لئے پرڄي ميں درج خوراك اور ڊبايت بر عمل ڪريون۔

જેઠાંચ

پاڪ-ભારત ٻيڙياڄول 23% एससि (উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক)

پاڪ-ભારત ٻيڙياڄول اڪ-টি সক্রিয় সিস্টেমাটিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক যা জেনেকা, ইউকে ৩ৈর করেছে। এর প্রধান কাজ হল জিবাবেলিন বাযোসিন্থেসিসকে প্রতিরোধ করা। এই যৌগকে সেটম টিস্যু অথবা মূলের মাথামে উপরের দিকে বিকাশশীল মেরিস্টেম এর দিকে এগিয়ে চলে এবং সেখানে গিয়ে কাজ করে। এটি নতুন শাখা প্রশাখার মধ্যকার দূরত্বকে হ্রাস করে এবং এতে অকৃষিত হওয়া বা শাখা ৩ৈর দ্রুত হয়। এর ফলে গাছের বৃদ্ধির দ্রুততাকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়। এর ফল অকুর বেরনা, ফলের রঙ এবং ফসলের উৎপাদনে অনুকূল প্রভাব পড়ে।

অনুমোদন সমূহ:

ফসল	কীটের সাধারণ নাম	মাত্রা/এইচ এ.আই. ফর্মুলেশন	জলের ধরণ	অগ্রিম স্ট্রে ও ফসল তোলার মধ্যকার সময় (দিন)
আম গাছ	বয়ল 7-15 বছর	15 মিলি	-	-
	বয়ল 16-25 বছর	20 মিলি	-	-
	বয়ল 25 বছরের বেশী	25-40 মিলি	-	-

ব্যবহারের নিবি:

আম গাছ শুধুমাত্র পরিণত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে (অন্তত 7 বছর বয়সের)। পাڪ-ভারত ٻيڙياڄولের অনুমোদিত পরিমাণ পরিষ্কার জলের (5-10 লিটার) সঙ্গে মিশিয়ে 5 সে.মি. থেকে 10 সে.মি. গভীর ও প্রায় 30 সে.মি দূর থেকে প্রয়োগ করতে হবে। ব্যবহারের পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিন অথবা উদ্ভিদের চাষদিকে ভালো করে দিয়ে ভালো করে ডিজিয়ে দিন।

ব্যবহারের সময়:
ফলের সংগ্রহের পর প্রয়োগ করুন। জুলাই থেকে অক্টোবরের বেকোন সময় ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ।

সাধারণতা:

- শিশুদের থেকে দূরে রাখুন।
- দ্রবপাটি নিয়ে কাজ করার সময় সুরক্ষা গ্লাভস পরুন।
- প্রোডাক্ট ব্যবহারের সময় ধূমপান করবেন না অথবা কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করবেন না।
- স্ক্রু ও চোখে ধ্রব পড়ে গেলে তক্ষুনি জল দিয়ে পরিষ্কার করুন।
- খাদ্য গ্রহণের আগে ও কাজ শেষের পর হাত ও দৃষিত ঝুক ধুয়ে দিন।
- পুকুরের জল দৃষিত করবেন না জলের উৎস অথবা পুকুর রাসায়নিক দিয়ে দৃষিত করবেন না।
- আসল পাত্রে প্রোডাক্টটি রাখুন, মূখ ভালো করে বন্ধ করে সুরক্ষিত স্থানে রেখে দিন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ:

স্নায়ু দুর্বলতা, উল্লেগ, হাত-পা কাঁপা, বমি ভাব ও এলার্জি হওয়া।

প্রাথমিক চিকিৎসা:

গলার পেছনে আঙ্গুল দিয়ে বমি করানোর চেষ্টা করুন। চিকিৎসা: যদি পেটের ভেতল চলে যায় তাহলে গ্যাস্ট্রিক ল্যামিনার্ট ব্যবহার করুন।

উদ্ভিদে বিষক্রিয়া:

প্রভাবিত মাঠায় ব্যবহার করলে কোন বিষক্রিয়াত হয় না।

প্রতিষেধক:

লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা করুন।

খালি পাত্র বিনষ্ট-করণ:

- প্যাকেজটিকে কেটে অথবা ভেঙ্গে দিয়ে বসতি থেকে দূরে মতিতে পুঁতে দিতে হবে।
- ব্যবহার করা হয়েছে এমন পাত্র/প্যাকেট এদিকে ওদিক ফেলবেন না।
- পরিবেশ দূষণ রখে পাত্র, অবশিষ্ট মিশ্রণ, বস্ত্র যোগ্য জল, এবং খালি পাত্র সুরক্ষিত স্থানে বিনষ্ট করুন।

সরবক্ষণের শর্তাবলী:

- উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রককের পাত্রকে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হাল্কাইলেটেড ন্যাপথালিন সালফোনেট
- প্যাকিংয়ের স্টিক
- জনানখাদ গাম
- সোডিয়াম ভেন্টোনেইট/ অ্যান্‌মিনিয়াম সিলিকেটে
- পলিভাইথাইল সাইলোসানস + সিলিকা
- বেঞ্জিডায়েথাইলজোলিন-3-ওয়ান
- প্রোপিলিন গ্লাইকল
- জল
- মোট:

পাڪ-ভারত ٻيڙياڄول এ.আই.	23.00%	ওজন/ওজন
আলকাইলেটেড ন্যাপথালিন সালফোনেট	3.00%	ওজন/ওজন

সোডিয়াম স্টিক	3.00%	w/w
জনানখাদ গাম	0.03%	ওজন/ওজন
সোডিয়াম ভেন্টোনেইট/ অ্যান্‌মিনিয়াম সিলিকেটে	2.50%	ওজন/ওজন
পলিভাইথাইল সাইলোসানস + সিলিকা	0.3%	ওজন/ওজন
বেঞ্জিডায়েথাইলজোলিন-3-ওয়ান	0.01%	ওজন/ওজন
প্রোপিলিন গ্লাইকল	5.00%	ওজন/ওজন
জল	পর্যাপ্ত মাত্রা	% ওজন/ওজন
মোট:	100.00%	ওজন/ওজন

সতর্কতা:
1. লেবেল ও লিফলেট নির্দেশিত ফসল ও কীটপতঙ্গ ব্যতিত অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নয়।
2. ফসল-কাটার পর ব্যবহারের জন্য নয়।
3. লিফলেটে দেওয়া নির্দেশ মতো ব্যবহারের পর খালি পাত্র বিনষ্ট করে ফেলতে হবে।
4. পলিহাউস এবং বন্ধ স্থানে ব্যবহার ও উপযুক্ত মাঠার জন্য- লিফলেট দেখুন।

জাস্টার

পাڪ-ভারত ٻيڙياڄول 23% एससि (উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক)

পাঠ-ভারত ٻيڙياڄولের অনুমোদিত পরিমাণ পরিষ্কার জলের (5-10 লিটার) সঙ্গে মিশিয়ে 5 সে.মি. থেকে 10 সে.মি. গভীর ও প্রায় 30 সে.মি দূর থেকে প্রয়োগ করতে হবে। ব্যবহারের পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিন অথবা উদ্ভিদের চাষদিকে ভালো করে দিয়ে ভালো করে ডিজিয়ে দিন।

অনুমোদন সমূহ:

ফসল	কীটের সাধারণ নাম	মাত্রা/এইচ এ.আই. ফর্মুলেশন	জলের ধরণ	অগ্রিম স্ট্রে ও ফসল তোলার সময় (দিন)
আম গাছ	বয়ল 7-15 বছর	15 মিলি	-	-
	বয়ল 16-25 বছর	20 মিলি	-	-
	বয়ল 25 বছরের বেশী	25-40 মিলি	-	-

ব্যবহারের নিবি:

আম গাছ শুধুমাত্র পরিণত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে (অন্তত 7 বছর বয়সের)। পাڪ-ভারত ٻيڙياڄولের অনুমোদিত পরিমাণ পরিষ্কার জলের (5-10 লিটার) সঙ্গে মিশিয়ে 5 সে.মি. থেকে 10 সে.মি. গভীর ও প্রায় 30 সে.মি দূর থেকে প্রয়োগ করতে হবে। ব্যবহারের পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিন অথবা উদ্ভিদের চাষদিকে ভালো করে দিয়ে ভালো করে ডিজিয়ে দিন।

ব্যবহারের সময়:

ফলের সংগ্রহের পর প্রয়োগ করুন। জুলাই থেকে অক্টোবরের বেকোন সময় ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ।

সাধারণতা:

- শিশুদের থেকে দূরে রাখুন।
- দ্রবপাটি নিয়ে কাজ করার সময় সুরক্ষা গ্লাভস পরুন।
- প্রোডাক্ট ব্যবহারের সময় ধূমপান করবেন না অথবা কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করবেন না।
- স্ক্রু ও চোখে ধ্রব পড়ে গেলে তক্ষুনি জল দিয়ে পরিষ্কার করুন।
- খাদ্য গ্রহণের আগে ও কাজ শেষের পর হাত ও দৃষিত ঝুক ধুয়ে দিন।
- পুকুরের জল দৃষিত করবেন না জলের উৎস অথবা পুকুর রাসায়নিক দিয়ে দৃষিত করবেন না।
- আসল পাত্রে প্রোডাক্টটি রাখুন, মূখ ভালো করে বন্ধ করে সুরক্ষিত স্থানে রেখে দিন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ:

স্নায়ু দুর্বলতা, উল্লেগ, হাত-পা কাঁপা, বমি ভাব ও এলার্জি হওয়া।

প্রাথমিক চিকিৎসা:

গলার পেছনে আঙ্গুল দিয়ে বমি করানোর চেষ্টা করুন। চিকিৎসা: যদি পেটের ভেতল চলে যায় তাহলে গ্যাস্ট্রিক ল্যামিনার্ট ব্যবহার করুন।

উদ্ভিদে বিষক্রিয়া:

প্রভাবিত মাঠায় ব্যবহার করলে কোন বিষক্রিয়াত হয় না।

প্রতিষেধক:

লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা করুন।

খালি পাত্র বিনষ্ট-করণ:

- প্যাকেজটিকে কেটে অথবা ভেঙ্গে দিয়ে বসতি থেকে দূরে মতিতে পুঁতে দিতে হবে।
- ব্যবহার করা হয়েছে এমন পাত্র/প্যাকেট এদিকে ওদিক ফেলবেন না।
- পরিবেশ দূষণের পরে পাত্র, অবশিষ্ট মিশ্রণ, বস্ত্র যোগ্য জল, এবং খালি পাত্র সুরক্ষিত স্থানে বিনষ্ট করুন।

সরবক্ষণের শর্তাবলী:

- উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রককের পাত্রকে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হাল্কাইলেটেড ন্যাপথালিন সালফোনেট
- প্যাকিংয়ের স্টিক
- জনানখাদ গাম
- সোডিয়াম ভেন্টোনেইট/ অ্যান্‌মিনিয়াম সিলিকেটে
- পলিভাইথাইল সাইলোসানস + সিলিকা
- বেঞ্জিডায়েথাইলজোলিন-3-ওয়ান
- প্রোপিলিন গ্লাইকল
- জল
- মোট:

পাڪ-ভারত ٻيڙياڄول এ.আই.	23.00%	ওজন/ওজন
আলকাইলেটেড ন্যাপথালিন সালফোনেট	3.00%	ওজন/ওজন
সোডিয়াম স্টিক	3.00%	w/w
জনানখাদ গাম	0.03%	ওজন/ওজন
সোডিয়াম ভেন্টোনেইট/ অ্যান্‌মিনিয়াম সিলিকেটে	2.50%	ওজন/ওজন
পলিভাইথাইল সাইলোসানস + সিলিকা	0.3%	ওজন/ওজন
বেঞ্জিডায়েথাইলজোলিন-3-ওয়ান	0.01%	ওজন/ওজন
প্রোপিলিন গ্লাইকল	5.00%	ওজন/ওজন
জল	পর্যাপ্ত মাত্রা	% ওজন/ওজন
মোট:	100.00%	ওজন/ওজন

সতর্কতা:
1. লেবেল ও লিফলেট নির্দেশিত ফসল ও কীটপতঙ্গ ব্যতিত অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নয়।
2. ফসল-কাটার পর ব্যবহারের জন্য নয়।
3. লিফলেটে দেওয়া নির্দেশ মতো ব্যবহারের পর খালি পাত্র বিনষ্ট করে ফেলতে হবে।
4. পলিহাউস এবং বন্ধ স্থানে ব্যবহার ও উপযুক্ত মাঠার জন্য- লিফলেট দেখুন।

ಜಸ್‌ಟರ್

ಪಕ್ಲೆಬ್ಯೂಟ್ರಾಜೊಲ್ 23% ಎಸ್‌ಸಿ (ಮೊಕ್ಕಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕ)

ಇದುಮಲೆ ಇನ್ನು ಪಕ್ಲೆಬ್ಯೂಟ್ರಾಜೊಲ್ ಒಕ ಅಂತರೃದ್ಧವಾಂ ನಿಯಂತ್ರಕಂ. ಇಡಿ ಯು.ಕೆ.ಲೆ ಜೆನೃಂಗೆ ಗುರ್ದಂಚಬಡಿಂ. ಜೈವಶಿವಿ ಬಯಾನಿಂಥ್‌ನಿನಿಂ ಅನುತೆಯೆಡೆಮೆ ಡಿಂ ಪ್ರಧಾನ ವರ್ದೃ. ಃ ರಸಾಯಂಕಂ ಪಾಡಂ ಕಣಪಾಂ ಲೆಡಾ ವೆಸ್ಲೆ ವ್ಯಾಂ ಇಂ ಶಿಖರಂ ವಿಭಾಜ ಕಣಪಾಲಂಕೆ ಡಿಂ ಪುಟ್ಟವುನ ವನಿಯುಕ್ಲೆ ಸ್ಥಾನಾಂಕಿ ವೆಳ್‌ವಂಚಿ. ಪೃಕ್ಲಂ ಶಕ್ತಿ ಕೌತ್ಲ ರೆಮ್ಲಂ ಪುರ್ದೃ ಕಪುಂಚಂ ಪುರ್ದೃ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಲೆ ಪಾಡವು ವ್ಯಾಂ ನಿಯಂತ್ರಿಂಚಬಡುಕುಂಚಿ ಮಂಚಯಂ ವಿವರಿ ಮ್ಯಾಗಲು ತ್ವಗ್ಯಂ ಗಾಂ ವಿರೃತೃತಾಯಂ. ಹೆಂ ಪು ಕಶೃತ್ರಾ: ಪಂಥು ರಂಗಂ ಪುಂಚಯಂ ಕೆತಲ ದಿಗಬಡಿ ಅನುಕುಾಂಂಗಾ ಪ್ರಭಾವಿಂಚಂ ಪೆಂಚುತಾಯಂ.

ನಿಘಾಂಚು:

ಹಂಚಿ ಕಿಲಕಂ ಸಾರ್ಕಂ ಪಾಟಂ	ಮಾಠಾಂಚು/ಪ್ರಾಕ್ಯಾಂಕಿ ನಿಶಿಲೆ ವಿಂಚು	ವಿಂಚಿ ವಿಂಚಾರ್ ಕೆತಲಕಂ ಕೆತಲಕಂ ಪುರ್ದೃ ಪೆಂ ಂತೆ ಪುಂಚಯಂ (ಲೆಡಾಯಂ)	-	-	-
ಮಾಡಿಡಿ ಪಯಸ್ಸು 7-15 ಸಂಚುಕ್ತುಯಾ	-	15 ಮಿ.ಲಿ	-	-	-
ವೆಠು ಪಯಸ್ಸು 16-25 ಸಂಚುಕ್ತುಯಾ	-	20 ಮಿ.ಲಿ	-	-	-
ಪಯಸ್ಸು 25 ಸಂಚುಕ್ತುಯಾ	-	25-40 ಮಿ.ಲಿ	-	-	-
ಕಂಚಿ ವಿಕೃತಂ	-	-	-	-	-

ಇಂಚಯಾಂನಿಂವೆಡಾಂನಿಂಕಿ ಸುಾಂವಂಚಲು:

ಕೆವಂಂ ಪಂಡಿಂ ಪುಡಿಂ ಮುಡಿಂ ಕೆಂಪಂ ಮೂಕ್ರಮೆ (ಕೆನಿಂ 7 ಸಂಚುಕ್ತುಯಾಂ ಪಾಡು). ಪಕ್ಲೆಬ್ಯೂಟ್ರಾಜೊಲ್ ನಿಘಾಂಚುಂ ಪೆಂನಿಂ ಪರಿಮಾಣಂಲೆ ಶುಭ್ರವುನ ನಿಶಿಲೆ (5-10 ಲಿ) ವಿಂಕ್ರಮಂ ಪೆಯಾಂ ಪುಂಚಯಂ 5 ಸಂ. ಸುಂಚಿ 10 ಸಂ. ಲೆತು ಕಾಲ್ಚ ತವ್ಯಾಂ ಪುಂಚಯಂ ಕಾಂವುಂಚುಂ ಸುಮಾರು 30 ಸಂ. ದುರಂಗಾ ಇಂಚಯಾಂನಿಂವೆಡಾಂ. ಇಂಚಯಾಂನಿಂವಂ ತರುನಾಕ ಪುಟ್ಟಣ್ ನಿಘಾಂಕಿ ಲೆಡಾ ಕಾಂವಾಂನಿಂಕಿ ನಾಲುಂ ವುಂಚುಂ ಬಾಂಗಾ ವೆನಿ ಪುರ್ಲಿಂಗಾ ನಾಂಚೆಪ್ಲಾಂಚಿ.

ಇಂಚಯಾಂನಿಂವಾಂನಿಂ ಪುಂಚಯಂ:

ಪಂಥ ಕೆತ ತರುನಾಕ ಇಂಚಯಾಂನಿಂವಾಂ. ಜಾವ್ನಲೆ ಅಕ್ಲೆಬರ್ ಪುರ್ದೃ ನಿ ಪುಂಚಯಂಲೆವುನಾ ಕಶ್ರಪುಂ.

ಪುಂಚು ಜಾಗ್ಣತ:

- ನಿಲ್ಲುಕು ದುರಂಗಾ ಇಂವಾಂ.
- ಕಾನ್ಪ್ರಿಶಿಂವಿಂ ನಿರ್ದೃವಾಂಚೆಂ ಪುಂಚಯಂಲೆ ರ್ತೃಣವಿಂಚ್ಚೆ ಗ್ಲೆವ್ಚೆ ಧರಂವಾಂ.
- ಃ ಇಂ ಕಶೃತ್ರವಿಂ ಇಂಚಯಾಂನಿಂ ಪುಂಚಯಂಲೆ ವಿಡಿ ಶಿನಿವಾಂ, ಠಾಂಗ್‌ವಾಂ, ಲೆಡಾ ಪಿಂಗ್ ಠಾಂಗ್‌ವಾಂ.
- ವರ್ದುಂ ಲೆಡಾ ಕಳ ಪುಡಿಂ ಕಾನ್ಪ್ರಿಶಿಂವಿಂ ವಂಚುಂಕೆ ಕಡಗಾಂ.
- ಪ್ಲೆಜನಾಲಕು ಪುಂಚುಂ ಪುಂಚಯಂ ಪನಿ ಪೆಂನಿಂ ತರುನಾಕ ಜಿಗ್ಣಶಕ್ತಿಯಂ ವರ್ದುಂ ಪುಂಚಯಂ ಪೆಕುಂಚುಂ ಕಡಗಾಂ.

