







MORFUS®

Chlorothalonil 75% WP Contact Fungicide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Chlorothalonil Tech. (based on 96% w/w): 78.12% w/w, Petro B.P. (Alkyl Naphthalene Sulphonate): 2.50% w/w, Maraspense N-22. (Sodium Lignosulfonate): 2.00% w/w, Wollastonite P.4 (Calcium Silicate): 3.00% w/w, China Clay: Q.S% w/w, Total:100% w/w. Direction Of Use: Please refer enclosed leaflet for details. Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals' food. 2. Avoid contact with mouth, eyes, and skin as it causing skin irritation & contact dermatitis. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. Antidote: No specific antidote. Treat symptomatically. Antihistamines may be given or apply steroid creams or systemic steroid to control allergic. First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. Symptoms: Headache, nausea, vomiting, allergic effects characterized by redness of the eyes, mild bronchial irritation and redness or rash on exposed skin areas may occur. Recommendations: Chlorothalonil 75% WP is used to control Tikka leaf spot and Rust of Ground nut, Early and Late Blight of Potato, Scab of Apple, Anthracnose & Downy mildew of Grape, Fruit rot of Chilli, Leaf spot of Cauliflower, Downy mildew & Leaf spot on Watermelon. Caution:- This product is highly toxic to fish, therefore should not be used near aquaculture. Warning: 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet; 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

मोर्फस

क्लोरोथालोनिल ७५% डब्ल्यू पी स्पर्शिय फफूंदीनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: क्लोरोथालोनिल टैकनिकल (९६: शुद्धता): ७८.१२: भार/ भार, पेट्रो (बी.पी.) (एलकाइल नेफथालीन सल्फोनेट): २.५०: भार/ भार, मैक्डोसेस एन. २२ (सोडियम लिग्नोसल्फोनेट): २.००: भार/ भार, वेलसटोनाइट पी ४ (कैल्शियम सिलिकेट): ३.००: भार/ भार, चाइना मिट्टी: पर्याप्त मात्रा भार/ भार, कुल: १००: भार/ भार. उपयोग के लिए निर्देश: उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: १. खाद्यसामग्री, खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचावें। ३. छिड़काव को वायु को साँस द्वारा अंदर जाने से बचावें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना-पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जी को रोकने के लिए एंटीहिस्टैमीनस दिये जा सकते हैं या स्टीरॉयड मलहम या सिस्टैमिक स्टीरॉयड इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा: १. यदि निगल जायें तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएं। यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी दारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाएं तो दूषित कपड़ों को उतार दे दूषित त्वचा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जाएं तो उनको काफ़ी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी में लगभग १०-२५ मिनट तक धोएं। ४. यदि साँस दार अन्दर गया हो तो गैंगी को शुद्ध हवा में ला जायें। लक्षण: सिरदर्द, मिनली, उल्टी, आँखों में लाली, साँस नली में थोड़ी जलन, त्वचा पर लाली तथा चकते उभर सकते हैं। उपयोग: क्लोरोथालोनिल ७५ प्रति गुलनशील पाउडर मूंगफली के टिक्का पर्णदाग और किट्ट रोग, आलू के अंगूठा और पछेता अंगमारी, सेब के पाप्प, अंगूर के रूथ रोग, मनुगुमिल फफूंदी, मिर्ची के फल विगलन, गोभी के पत्ती धब्बा, तरबूज के मुदुगुमिल फफूंदी, पत्ती धब्बा रोग के निवृत्त हेतु प्रयोग किया जाता है। सावधान:- यह उत्पाद मछलियों के लिए बहुत विषाक तथा इसका प्रयोग मत्स्य पालन के नजदीक न करें। सावधानियां: १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३) पर्वों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट करें। ४) पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक-पर्वों देखें।

मोर्फस

क्लोरोथालोनिल ७५% डब्ल्यूपी संपर्क सूचनाशक

उपयोग करता पहलेवा लेनी साथे जोडेदी पत्रिका वांचो. रासायनिक संयोजन: क्लोरोथालोनिल टैक. (९६% डब्ल्यू/डब्ल्यू पर आधारित) : ७८.१२% डब्ल्यू/डब्ल्यू, पेट्रो बी.पी. (आल्फाएल नेफथालिन सल्फोनेट) : २.५०% डब्ल्यू/डब्ल्यू, मेरास्पेस एन-२२. (सोडियम लिग्नोसल्फोनेट) : २.००% डब्ल्यू/डब्ल्यू, वोलास्टोनाइट पी.४ (कैल्शियम सिलिकेट) : ३.००% डब्ल्यू/डब्ल्यू, राइना क्ले: क्यू.एस.५ डब्ल्यू/डब्ल्यू, कुल: १००% डब्ल्यू/डब्ल्यू. उपयोग अंगे मार्गदर्शन: विगतो माटे साथे जोडेदी पुस्तिका चुओ. सावधेती: १. पाठ पढावो, पाठी पाठ पढावोना कन्वेनर अने प्राणीओना जोराकधी दूर राओ. २. मो, आंभो अने त्वचा साथे संपर्क टाओ. ३. स्पेना छांटाने श्वासमां देवानुं टाओ. पवननी दिशामां स्पे करो. ४. स्पे कर्वा पछी दूषित कपडां अने शरीरना भागोने सारी रीते धोई लो. ५. स्पे करती वजते पीतुं, पातुं अने कर्षण यावतुं के धूम्रपान करतुं नही. ६. मिश्रण अने छंटाव करती वजते संपूर्ण रक्षात्मक कपडां पढेचो. विषमारक: कोई विशिष्ट विषमारक नथो. लक्षणो मुचय सारवार करो. अलर्जीने निबन्धित करवा माटे अन्टिहिस्टैमार्फन्स आपवामां आवी शके छे अथवा स्टीरॉयड कीम अथवा प्रणालीगत स्टेरॉयड वायु करी शकय छे. प्राथमिक सारवार: १. जो गजवामां आवे तो गजाना पाखला भागमां हजवोथी थपथपावीने डिलटी करावो. डिलटी पूरेपूरी न थई जाय त्वां सुधी तेने पुनरावर्तित करो. जो हई ओमान होय तो डिलटी करावो नही. २. जो कपडां अने त्वचा दूषित थया होय, तो कपडा काडी नाभो अनेदूषित त्वचाने पुष्कल प्रमाथमां साबु अने पाणीधी धोई लो. ३. जो आंभो दूषित थई होय, तो लगभग १० थो १५ मिनट सुधी पुष्कल पासा / शुद्ध पाणीधी छालक मारी धोई लो. ४. जो श्वासमां देवामां आवे तो, हईने ताशु हवामां लई जाओ. सिद्धो: माथानो दुभावो, डिनडा, डिलटी, आंभोमां लावाश, श्वासननीमां हजवी वजतरा अने त्वचाना पुष्कल भाग पर लावाश अथवा डोडीओ वेदी अलर्जीक असरो थई शके छे. (मलामलो): क्लोरोथालोनिलनो उपयोग टिकाना पांटांना डाघ अने मगडगीना सडा, लटाकानी अर्ली अने लेट प्लाघट, सडरपननी र्केण, द्रासना अन्थेकनोश अने डाडिनी माधुल्य, मरचानो कुरुट चोट, कोपीनना लीक स्पोट, डाडिनी मिळ्यु अने तरबूज परना लीक स्पोटने निबन्धित करवा माटे थाय छे. सावधेती:- आ प्रोडकट माखडी माटे भुज १२ ग्रेडी होय छे, तेथी वजयस्डिसेरनी नशुक तेनो उपयोग न करवो जोधईओ. सेतवणी: १. लेवल अने पत्रिका पर निर्दिष्ट कर्वा सिवायना पाड पर उपयोग करवो जोधईओ नही. २. कापडी पछीनी कामगीरीओ माटे उपयोग करवो जोधईओ नही. ३. पत्रिका पर निर्दिष्ट कर्वा मुचय उपयोग कर्वा पछी कन्वेनरनो निडाव करो; ४. पोली हाउस अने सीमित विस्तार माटे दिश-निर्देशो अने डोश-पत्रिका चुओ.

मोर्फस मारुप्स

# MORFUS®

## Chlorothalonil 75% WP

### मोर्फस

### क्लोरोथालोनिल ७५% डब्ल्यू पी



CONTACT FUNGICIDE स्पर्शिय फफूंदीनाशक

Net Content 1 kg शुद्ध मात्रा १ कि ग्रा



Regn. No. : CIR-228891/2022-Chlorothalonil (WP) (442)-285  
पंजी. नं. / रजि.नं.: सीआयआर-२२८८९१/२०२२-क्लोरोथालोनिल (डब्ल्यू पी.) (४४२)-२८५  
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187  
उत्पादन लाइसेंस नं. / ઉ.લા.ન. : एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

Batch No. : बैच नं. : डेय नं.:

Mfg. Date : उत्पादन तिथि : ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date : समापन तिथि : અવધી સમાપ્તિ તારીખ:

Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹: अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹ : વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં ₹ :

Unit sale price per gm ₹ :

Net Content : 1 kg शुद्ध मात्रा : १ कि ग्रा

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Re-entry: 24 hours

®-Registered Trademark

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

For Agricultural Use

कृषि उपयोग के लिए



## मॉटफस

क्लोरोथालोनिल **75% डब्ल्यू.पी** (स्पर्शक बुस्त्रीनाशक)

क्लोरोथालोनिल 75% डब्ल्यू पीआ बापर मुईगुमाराजिक टिकाका लीफ स्पॉट आणि रस्ट, बटाट्यावारील अली आणि लेट ब्लॉइट, सफरचंदानवारील रूब, द्राक्षावारील एथानाणू आणि डाउनय मिल्ड्यू, मिन्चीवारील फुट रॉट, पंलावारील लीफ स्पॉट, कलिगंडावारील डाउनय मिल्ड्यू आणि लीफ स्पॉटच्या नियंत्रणासाठी केला जातो. यक्षांना- हे उत्पादनात माशांसाठी अतिशय विषारी असल्यामुळे मत्स्यपालन होत असलेल्या टिकाणी याचा वापर करू नये.

**उपयोग:**

पिकाचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा	पाण्याचे प्रमाण (ली.)	अंतिम फसवारी आणि पीक कापावयाचा काळतात जखर (दिवसात)
स.त.	सं.त.	सं.त.	
(कि.ग्रॅ.)	(कि.ग्रॅ.)		

सफरचंद	खंड	0.150% (150 ग्र.)	0.200% (200 ग्र.)	10पाणी/ 100 लिटर/ 100 ग्र.पानी	10/ 500	45
पंलाव	लीफ स्पॉट	1.5 ग्र./ 2.0 ग्र./ 1.0 पाणी	2.0 ग्र./ 3.0 ग्र./ 1.0 पाणी	स.त. लि. वि. 500	500	3
मिन्ची	फुट रॉट	600	800	750	10	70
द्राक्ष	एथानाणू आणि डाउनय मिल्ड्यू	0.15% (150 ग्र.)	0.2% (200 ग्र.)	10पाणी/ 100 लिटर/ 100 ग्र.पानी	100	60
मुईगुम	टिकाक लीफ स्पॉट, रस्ट	0.66- 0.863	0.88- 1.150	800- 1000	600- 800	14
मटाटा	अली आणि रोट रॉट	0.66- 0.937	0.875- 1.250	800- 1000	800	14
कलिंग	डाउनय मिल्ड्यू आणि फुट स्पॉट	1.5 ग्र./ 2.0 ग्र./ 1.0 पाणी	2.0 ग्र./ 3.0 ग्र./ 1.0 पाणी	स.त. लि. वि. 500	500	3

**वापरण्यासाठी निर्देश:** नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्प्रेसन नेपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेसन नेपसेक बॅटरी स्प्रेयर आणि एस्प्रोप्रीईट-एचटोपी पींपर स्प्रेयर.

**वापरण्याची वेळ:** कापणा प्रारंभपूर्वी होताना.

**वापरणाऱ्याची ध्यावयाची काळजी:** 1. खाद्य पदार्थ, खाद्य सामान, खाली पाणी आणि पशु आडव्या रस्तू राखू. 2. यक्षांना- खास तसे घेऊ नये तसेचवर पशू देऊ नये किंवा ताली सामने घेऊ नये. 3. नेहमी हवेच्या दिशेने ही फसवारी काढा. हवेच्या दिशेद्व दिशेने फसवारी करू नये. कारणा फसवयावे तिथीचे आपल्या आंगावर उडू नये. 4. प्रयोगांतलर लोखंबच कापडे घ्याय व चानन करा. 5. प्रयोग करतोवेळी खाणे, पिणे घ्याऊन कापण तयार पान घालणे टाळावी करू नये. 6. फसवारी करते वेळी सुसुखा सामान कापडे घ्यावेत.

**विषबाधेची लक्षणे:** डोळेदुखणी, मारामळ, उलटी, अंत्यजिजि माणस जाचे तसेच डोळे ताल होणे, यक्षत मलिकेत स्याे खाऊ आणि संयकतीतल तसेचर लालसरपणा किंवा पुख उदरमुदू शकतात.

**प्रथमोपचार:** 1. निळल असल्यास, मानेवर धोपदून उलटी काढा. उलटीतून उरलेख पाणी पडेथीतून असं पुढता पुढता कापत रहा. २.कणू वेळीच असल्यास उलटी करू नये. 3. कणू घेऊन खाद्य व्हाय दूथित आल्यास कापडे कादून टाका आणि दूथित ल्याय भरपूर पाणी आणि साबणाचे रसख घ्या. 4. डोळे दुथित आल्यास भरपूर सालांजणू / रसख पाण्याने सुमार 10-15 मिनिटे घुसा. 4. रवासातटे आत गेल्यास रुणाणा लोकाळणू हदत व्हा.

**शाळांना विषबाधा:** निराश्रित प्रमाणात प्रयोग केलात तर शाळाणा विषबाधा होत नाही.

**उत्तारा:** कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणांनुसार उपचार करावा. एचसीएलसी एन्टीहिस्टॅमिनस देऊ शकता.

**डब्याची विळेवट:** 1. बुरशीनाशकांचे रिक्ताने उबे आणि उलतेत बुरशीनाशक नष्ट करणं आणि सुरक्षितपणे उबे घुणं ही बुरशीनाशक तयार करणारे, निमित्त आणि वापरणाऱ्याची जबाबदारी आहे ज्यामुळे पर्यावरण आणि जल प्रदूषण होणार नाही. 2. वापरून घेतोना झालेली पॅकेजिंग पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून उपचारावर ठेवू नयेत. 3. रिक्तानी पॅकेजिंग फाडून-तोडून, रसवारीपासून दूर जामी पुसून टाळावे. **साठवणूक:** 1. बुरशीनाशक असणारी पॅकेजिंग, इतर मात विषाचे खाद्यपदार्थां साठवणाऱ्यासारखा वापणाच्या सोळाय, जागा वापासून द्याऊ खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावेत. किंवा ती त्यांचे प्रमाण आणि रसकू साठवण करून वेगळ्या कपाटातही कडीकुलपान ठेवावीत. 2. बुरशीनाशकच्या साठवणीकडून असलेल्या खोल्या, जागा वापणाच्या उरलेखना, वाळत्या बाबलेल्या, कोरडव्या, थंड, हवा घेतलेली राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असल्यात.

<b>रासायनिक रचना:</b> <p>कोलोरोथालोनिल टेंक. (96% मात्र /मात्र (96% मात्र /मात्र पर आधारित) पेट्रो बी.पी. (अंत्यजिज) मॅथॉलिन सफुणेनेट मॅगटॉलसर्प एच 22 (सोडीयम लिगोसल्फोनेट) मॅगटोसाल्फेट पी 4 (कॅल्शियम सिलिकेट) विनी माती</p>	78.12% मात्र /मात्र 2.50% मात्र /मात्र 2.50% मात्र /मात्र 2.00% मात्र /मात्र 2.00% मात्र /मात्र 3.00% मात्र /मात्र	78.12% मात्र/मात्र 2.50% मात्र/मात्र २.५०% मात्र/मात्र २.००% मात्र/मात्र २.००% मात्र/मात्र ३.००% मात्र/मात्र	
<b>इशारा:</b> <p>1. लेबल आणि निर्देश पकिशत उल्लेख असलेल्या कोटक आणि किर्यायितिक इतर कोणाचीही कोटक आणि पिकासाठी याचा वापर करू नये. 2. कापणी नंतर वापर नये. 3. वापरण्यातून रिक्ताने उबे निशेध पकिशत सांगितल्याप्रमाणे नष्ट करावेत. 4. पॉलि हाऊसस आणि निष्कारित क्षेत्रासाठी निशेध आणि प्रमाण-निर्देश पकिशत वाचा.</p>			
<b>वस्तुमान:</b> <p>1. लेबल आणि निर्देश पकिशत उल्लेख असलेल्या कोटक आणि किर्यायितिक इतर कोणाचीही कोटक आणि पिकासाठी याचा वापर करू नये. 3. आ उत्पादनातून लिक्विडतम जळाय्या मुद्रण मारा करू. 4. पॉली डब्यात तमज ३-मॉडेल विस्तार माटेतमं सुचणे अने मारा अंघेनी श्राधक्षरी मड दे लिक्विडत वांचे.</p>			

## मोटॅड्स

क्लोरोथेबोनिल **75% डब्ल्यु.पी.**

(स्पर्शीय ड्रगनाशक)

क्लोरोथेबोनिल 75% डब्ल्यु.पी.ने एथानाणू मजडमीना पक्षमंनं यता टीक्ष वीक्ष स्पॉट अने रस्ट, भटाटकाप पक्षमंनं यता अली अने बोट व्हाउट, सफरचनाप पक्षमंनं यता रंक्ष, झुलप पक्षमंनं यता मनेचरेडनोळ अने अडोनी मिड्यू, मरचयानां डूट रोटे, ड्रुवावरन पक्षमंनं यता वीक्ष स्पॉट, तरचयाना पक्षमंनं यता अडोनी मिड्यू अने वीक्ष स्पॉट वगैरे पर अडुक्ष रक्षपणा माटे इरचमंनं आरंभ करे. सारचेवेली: आ उत्पादना माधुवीबो माटे अनेतल उरेतेवळुं होवयावी तेनी उपधोय श्रयचर अजयुष्टिनी आवापणाच्या विस्तारमाटे इरचो श्रेडंनं नयेती.

ध्यावयाचे:	श्रीपाणीत	माटवारात	पट्टी विंच	अंजम दिक्कण
पक्षमंनं नयेप	संयानय नाम	प्रति डेक्टर मात्रा (डि.आ.)	पक्षमी (डि.आ.)	अंजम दिक्कण अडे एचपी चरलीअन अडोल (दिन) विंच
सं. त.	सं. त.	सं. त.	सं. त.	
(डि.आ.)	(डि.आ.)	(डि.आ.)	(डि.आ.)	

सफरचंद	खंड	0.150% (150 ग्र.)	0.200% (200 ग्र.)	10 पाणी/ 100 लिटर/ 100 ग्र.पानी	10/ 500	45
ड्रुवावर	वीक्ष स्पॉट	1.5 ग्र./ 2.0 ग्र./ 1.0 पाणी	2.0 ग्र./ 3.0 ग्र./ 1.0 पाणी	स.त. लि. वि. 500	500	3
मरचं	रुंटे रोटे	600	800	750	10	60
द्राक्ष	अनेचरेडनोळ	0.15% (150 ग्र.)	0.2% (200 ग्र.)	10पाणी/ 100 लिटर/ 100 ग्र.पानी	100	60
मजधमी	टीक्ष वीक्ष स्पॉट	0.66- 0.863	0.88- 1.150	800- 1000	600- 800	14
यक्षीक्ष	अली अने रोट रॉट	0.66- 0.937	0.875- 1.250	800- 1000	800	14
तरचय	अडोनी मिड्यू	1.5 ग्र./ 2.0 ग्र./ 1.0 पाणी	2.0 ग्र./ 3.0 ग्र./ 1.0 पाणी	स.त. लि. वि. 500	500	3

**उपयोगी दिशानिर्देश:** नेपसेक स्प्रेयर, डूट स्प्रेयर, झोमेक्षण नेपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेसन नेपसेक भेटीरी स्प्रेयर अने अमेजेसपीछड-मयेटीरी पावर स्प्रेयर.

**उपयोगी नसवय:** रोजनानं बक्षणे होणावा याचे त्याचे.

**वापरण्याचे साधने:** 1. आद्य पदार्थ, भास सामग्रीना पाळी पाय अने पक्षभोना यदवारी दूर राहो. 2. थ्यास, त्या अने आंघु ने संपेक्षीत भयावो. 3. छंटाक्षवना भास मं जळायी भयावो अने यामनी दिशा मं छंटाक्षव करे. 4. छंटाक्षव ना पडती प्रकृति श्रय अने भवानीनं धोरुं वेवा. 5. छंटाक्षव नयेत, पाय पीवानू, तंभाउं पीली सीगरेट पीवानू भंय करे. 6. वापरनाटे संपुणेपुशे सुक्ष्मतास श्रयंनं पंदेव्या श्रेडंनं.

**उरेंना साधने:** मायामं ड्रुवापो, उपक्ष, उंटी, अंत्यजिजि असर शंभं आंघो यदव थंय अली उषवी. उषवी भ्रांउंटी अनेवद्वारा अने यामनीना भास भ्याणे पर बाळाक्ष पदतंनं यक्षमंनं थंय अंय वगैरे छंटे शंके छे.

**प्रथमोपचार:** 1. जे अंघी श्रय ते गणाना पाछवा भागमंनं यदवारीयक्ष इरीनी उषवी करे. उंटी दारा सांन ना थाय तंय सुथी तेने पुनराचरना करे. जे दटी भंयाना छंय ते उषवी ती इरचोव. जे श्रय अने यामनी दूथित छंय ते श्रयंनं अडे अने दूथित ल्यायने सधने अने पाळीवी थुयो. 3. जे आंघो दूथित छंय ते, ते बलवान 10 थी 15 मिनिट माटे भायलंरसख पाळीवी पुशणू वदव करे. 4. जे आंघो बंदवामं आंने, ते दटीने तक्ष घ्यावामं वदव.

**श्रीनी विषयुक्तता:** श्रुटीरी मात्रामंनं उपधोय इरचवी छंटांनं जेरे यक्षंनं नयेती.

**उरेंना साधने:** झंठ विषनाशक श्रयानू नथी. बक्षणे मुश्रण सावरा करे. अवेक्ष रंक्षपणा माटे अंटीडिसेंमिअंभी श्रयक्ष घे.

**पाळी उष्मठोना निक्षार:** 1. आ ड्रुगनाशकाना निष्कारत अने उपधोयक्षतनीने इरश्र छंे ते उष्मठपेक्षर ते भयेव ड्रुगनाशक त्या साधनांच्या निष्कारत निक्षार सुरक्षित ठीते करे. श्रेथी वातावरणते छे पाळी दूथित न थाय. 2. पाळी उष्मठोनाने इरीथी उपधोय थतो रंक्षपणा माटे अंघनं नयेत न इक्षणे. 3. पाळी उष्मठोनाने तीनीने रसवीथी दूर छंटी द्या श्रेडंनं.

**संक्षर:** 1. ड्रुगनाशक श्रयानो संक्षर, श्रुद्य ओरडत ते स्थानमंनं असर वस्तुभो, भास इरीने भाद्य पदार्थ श्रापणानं आरंभवी दूर इरचो श्रेडंनं. ३. ड्रुगनाशकतून प्रभास अने प्रक्षर प्रभास उष्मठोनाने अलव इक्षारत तंभाय्यावीमं भंय इरीने नयेत. 2. ड्रुगनाशकतून संक्षर ओरडत ते स्थान उषव-उष्मठवयाणा, मरचयु अने पुरेंना बंधारी पक्षोपायवोनी होवो श्रेडंनं, श्रेथीवी भाय मद्रक्षण न थाय.

<b>रसायनिक रचना:</b> <p>क्लोरोथेबोनिल टेंक. (96% मात्र/मात्र) पेट्रो बी.पी. (अंत्यजिज) मॅथॉलीन सफुणेनेट मॅगटोसिल्वर्स अंन 22 (सोडियम विगोसल्फोनेट) वेवा असेटोटीनांश्ट पी 4 (कॅल्शियम सोबीडेट) याठना इवे</p>	78.12% मात्र/मात्र 2.50% मात्र/मात्र २.५०% मात्र/मात्र २.००% मात्र/मात्र २.००% मात्र/मात्र ३.००% मात्र/मात्र	78.12% मात्र/मात्र 2.50% मात्र/मात्र २.५०% मात्र/मात्र २.००% मात्र/मात्र २.००% मात्र/मात्र ३.००% मात्र/मात्र	
<b>इश:</b> <p>१. लेबल अने विळेवट माटेतमं दद्यांया छंय ते सिवायना पाक्षे अने छ्याय पर आ उत्पादनातून छंटाक्ष अडोवणी इरचोव अने श्रेडंनं. 2. क्षाषीत/क्षायी पक्षीना छंटाक्ष अडोव तेनी उपधोय इरचो न श्रेडंनं. 3. आ उत्पादनातून लिक्विडतम जळायी मुद्रण मारा करू. 4. पॉली डब्यात तमज ३-मॉडेल विस्तार माटेतमं सुचणे अने मारा अंघेनी श्राधक्षरी मड दे लिक्विडत वांचे.</p>			
<b>वस्तुमान:</b> <p>1. लेबल अने विळेवट माटेतमं दद्यांया छंय ते सिवायना पाक्षे अने छ्याय पर आ उत्पादनातून छंटाक्ष अडोवणी इरचोव अने श्रेडंनं. 2. क्षाषीत/क्षायी पक्षीना छंटाक्ष अडोव तेनी उपधोय इरचो न श्रेडंनं. 3. आ उत्पादनातून लिक्विडतम जळायी मुद्रण मारा करू. 4. पॉली डब्यात तमज ३-मॉडेल विस्तार माटेतमं सुचणे अने मारा अंघेनी श्राधक्षरी मड दे लिक्विडत वांचे.</p>			

## मोटॅडस

क्लोरोथालोनिल **75% डबळियु.पी.**

(स्पर्शीय ड्रुॅलीनाशक)

क्लोरोथालोनिल 75% डबळियु.पी.तुन एथानाणू मजडमीना पक्षमंनं टिका आणि रोट, आरुची अलीअडे पळेक्षी वंशो. सेच दे हल पना, अंठुळी अडे ओवेरळनाळि रोटेचर एचपी, विंचर दे हल सडन, ड्रुवांशुका आणि उंटी वदव. उरक्षुण अडे रोटेचर एचपी अडे पंटी वदव श्रीपाणी अडे बॅटरीस लक्षी सिस्तेमल वंशो नापणे १. सध्यातल एच उंज्याप मॅथोना तथे वॅटॅट जॅरिहोवणे अडे हियाची वडंउ मॅथी पळखटे दे नेडे जे नाह ।

ध्यावयाचे:	श्रीपाणीत	माटवारात	पट्टी विंच	अंजम दिक्कण
पक्षमंनं नयेप	संयानय नाम	प्रति डेक्टर मात्रा (डि.आ.)	पक्षमी (डि.आ.)	अंजम दिक्कण अडे एचपी चरलीअन अडोल (दिन) विंच
सं. त.	सं. त.	सं. त.	सं. त.	
(डि.आ.)	(डि.आ.)	(डि.आ.)	(डि.आ.)	

सेच	पाना	0.150% (150 ग्र.)	0.200% (200 ग्र.)	10 ली/ 100 लिटर/ 100 ग्र.पानी	10/ 500	45
रोश्री	पंटी यक्ष	1.5 ग्र./ 2.0 ग्र./ 1.0 पाणी	2.0 ग्र./ 3.0 ग्र./ 1.0 पाणी	स.त. लि. वि. 500	500	3
मिंठवर	हल सडन	600	800	750	10	60
अंठुवर	ओवेरळनाळि	0.150% (150 ग्र.)	0.2% (200 ग्र.)	10पाणी/ 100 लिटर/ 100 ग्र.पानी	100	60
मुंशुळाची टिका पंटी	रोश, विंटे	0.66- 0.863	0.88- 1.150	800- 1000	600- 800	14
आरु	अलीअडे पळेक्षी	0.66- 0.875	0.88- 1.150	800- 1000	800	14
उरक्षुण	अंठुवर एचपी	1.5 ग्र./ 2.0 ग्र./ 1.0 पाणी	2.0 ग्र./ 3.0 ग्र./ 1.0 पाणी	स.त. लि. वि. 500	500	3

**उपेक्षणमल लक्षी निरचने:** ांठ 'उे लॅट्टट दाला डिक्कण अंजंउ, पेठे लाल छडखट दाला डिक्कण अंजंउ, ठोमसे सद्यान लाल छडखट दाला डिक्कण अंजंउ अडे मखती लाल छडखट दाला अडे भेमे पी.डी.ए-अंघु टी.पी. डिक्कण अंजंउ.

**उपेक्षणमल एा मंम:** श्रीपाणी अडे लक्ष अट्टिटे दे मंम।

**उपेक्षणमल लक्ष रक्षामंनं लक्षी सध्यावणी:** १. पण्ट पॉट टीअं चीअं अडे एठेन उं दे धली वडउत अडे पळानं अडे चणे उ चुर वदव । २. कुर, चरणी अडे अंघं दे व्हड उं यक्षपी. 3. डिक्कण एा ड्रुव उं मरा पीटी अंठुव ना जख टींण। उण व ती टिका विंच डिक्कण करे। 4. डिक्कण एा चरव दूथित व्कडे अडे मखीटे अडे उणानं उं चुरी जतु वदव । 5. डिक्कण एा अडे पुंठवना, पण्टा पीटी अडे वरु वी सफुट्टा अणू वी । 6. डिक्कण वरत मंम सें मिळखटे वरुते पुंठु मखीअंनं व्कडे पळे।

**चरित अडे लॅट्टट:** मिठवर, मी कॅण उण्टा एुल्लटी, अंघं एा लक्षी वरुगी ओवेरळनिय पुश्रव, मणुल्ली व्कूवॉट्ट उरक्षलीअडे चरनी अडे पुंठु रिंमिअं 'उे लक्षी नं वडउं उे मखे उण्टे।

**पट्टी विंचिउना:** 1. नेचर निगल रिश्ना नये जे गळे डिक्के गुदगुदी वरुते एुल्लटी वरुचिं घिच रिश्ना एुटे उर उण्टवएुटे व्हि जंउ उर एुल्लटी एुणारा निळला पंलवख मळार न हो चडे। ते मडंमिअंवेस उेउे जे एुल्लटी ना वरुचिं । 2. नेचर व्कडे अंठु उण्ट वरुचिं उे नये जे दूथित व्कडे लण घिच अडे उण्टे नये वरुगी मळार विंच मखड अडे पट्टी लाल घेउे । 3. नेचर अंठु दूथिअं उे नाट जे एुल्लं नये वरुगी मळार विंच मेलोव्ना.मळारुती लाल तळवने मळार 15 मिंटे उर घेउे । 4. ते मरा लाल अंठुव रिश्ना एुटे जे रणुगी नुं मूंग उण्टा विंच ले चणे।

**पेट्टाचरिंलण्ट:** निगलानुच मळार अणुवण उपेक्षणमल वरत 'उे पेट्टे चरिंतीलण्ट लणी उे।

**चरित नडवख:** वरुगी मण चरिंउ उंउ लणी वी । लॅट्टटां अणुवण इटिआय करे । अंठुळनी लक्षी अंटीडिसेंमिअंनं एुटे जे मखटे लक्ष।

**पंली रंक्षीअं एा निरचनार:** 1. एिच एुॅलीनाशक अडे उपेक्षणमलवडक एा सिंमिअंनं उे रिच एुटे रंक्षीअं/पेठेस नं यधे उे एुॅलीनाशक अडे सध्याने एा निरचनार सुरक्षिअड रंक्षे लाल वरु मि लाल चुरिंउनार जे पाटी पट्टेचिंउ ल एडे। 2. एुण्णज विंटे उण्टे रंक्षे/पेठान एा मखर ता डड। हिया उण्टा एुण्टा एा चरवण एुण्णज सध्यावणी न सधर एे। 3. वेडेउर/रंक्षीअं उे उर-भेउर उंउ उरु जंमिअं विंच चंउ विंच एिच।

**उंठुव उण्टा मखडं:** 1. एुॅलीनाशक अडे रंक्षे एा उंठुव अलगा वरुते नं मखड 'उे उण्टे यक्षं रिश्मे उंउ 'उे यक्षमं पंलवख अडे उंठुव वरुते उं चुर वरुगी नाट चरणीउे न एे जे एुॅलीनाशक एा मळार अडे उण्टास 'उे निरक्षर वरुते एडे रंक्षीअं नुं वंशुगी अलव इक्षारत तंभाय्यावीमं भंय इरीने नयेत । 2. एुॅलीनाशक अडे उंठुव वणार नं मखल वंशुगी दाला, मखडु घडटटट दाला, श्राध, उण्टावर अडे मेल्ली लक्षीची-सुडगी एा उंउ चरणीउे ने मि लाल दालम एुणारा पुश्रवट ल एडे।

<b>उण्टाचरिंलण्ट मंजंउनार:</b> <p>क्लोरोथालोनिल टेंक. (96% मात्र /मात्र) पेट्रो बी.पी. (अंत्यजिज) मॅगटोसिल्वर्स अंन 22 (सोडियम लिगोसल्फोनेट) वेवा असेटोटीनांश्ट पी 4 (कॅल्शियम सिलिकेट) चाट्टेला वरुते जॅनी मिंटी वरुवः</p>	78.12% मात्र /मात्र 2.50% मात्र /मात्र 2.50% मात्र /मात्र 2.00% मात्र /मात्र 2.00% मात्र /मात्र 3.00% मात्र /मात्र	78.12% मात्र/मात्र 2.50% मात्र/मात्र २.५०% मात्र/मात्र २.००% मात्र/मात्र २.००% मात्र/मात्र ३.००% मात्र/मात्र	
<b>उपचननी:</b> <p>1. लेबल अडे लॅक्वेट 'उे सिवळ रंक्षीअं झाला अडे रंक्षी जे उंउ विंच 'उे उपेक्षणमल ना करे। 2. एाची उं यणलटे अडे उपेक्षणमल लक्षी वडउे उण्ट लक्षी एाउे । 3. उपेक्षणमल उं यणल लॅक्वेट 'उे एुटे निरचनार अणुवण रंक्षे नुं जण्ट वरु एिच । 4. पंली गुणुमिअं अडे अंठु रिश्नाचे लक्षी निरचनेअं अडे मळार लक्षी-लॅक्वेट देणे।</p>			
<b>वस्तुमान:</b> <p>१. लेबल अडे लॅक्वेट 'उे सिवळ रंक्षीअं झाला अडे रंक्षी जे उंउ विंच 'उे उपेक्षणमल ना करे। 2. एाची उं यणलटे अडे उपेक्षणमल लक्षी वडउे उण्ट लक्षी एाउे । 3. उपेक्षणमल उं यणल लॅक्वेट 'उे एुटे निरचनार अणुवण रंक्षे नुं जण्ट वरु एिच । 4. पंली गुणुमिअं अडे अंठु रिश्नाचे लक्षी निरचनेअं अडे मळार लक्षी-लॅक्वेट देणे।</p>			

## मोर्फस

क्लोरोथालोनिल **75% घुलनशील पाउडर**

(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

क्लोरोथालोनिल 75 प्रतिशत घुलनशील पाउडर मुंगफली के टिकाक पर्णदास व फिट्ट टट, आरु के अंगेता और चणेता अंमारी, सेच के पाना, अंगूर के पत्ती वरु, मुसुरीसिल फफूंदी, मिर्ची के फल विलान, मीमे के खसो भव्या, तरबूज के मुसुरीसिल फफूंदी, पत्ती यक्षान रंग के निरंजना हेतु प्रयोग किया जाता है । सावधान- यह उत्पाद मछलियों के लिए प्रयोग किया नहीं जा सकता।

उपयोग:	रोग के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा (स. त.वत् (कि.ग्रा.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
सेच	पाना	0.150% (150 ग्र.)	0.200% (200 ग्र.)	10 ली/ 100 लिटर/ 100 ग्र.पानी
मोची	पत्ती यक्ष	1.5 ग्र./ 2.0 ग्र./ 1.0 पाणी	2.0 ग्र./ 3.0 ग्र./ 1.0 पाणी	स.त. लि. वि. 500
मिर्ची	फल निगल	600	800	750
अंगूर	रुक्ष रोग,	0.15% (150 ग्र.)	0.2% (200 ग्र.)	10पाणी/ 100 लिटर/ 100 ग्र.पानी

सेच	पान
-----	-----

