PARTY : PRABHUKRUPA
JOB NAME : PIXMA SYSTEMIC AND CONTACT FUNGICIDE 1 KG
DATE : 30.10.2023
ARTIST : KP

This JPEG / PRINT may not be mached exactly with our Gravure Cylinder Proof.
While every effort has been made to carry out instruction to the customer's satisfaction, we will not be liable for errors not noted on this print. Customers are requested to check the Artwork along with it's diamensions throughly before authorising for Engraving.

BLACK	P 576 C	P 5473 C	CYAN	P 5473 (10%) C	WHITE
		COMMON	COMMON	COMMON	COMMON

500. mm
15 mm | 117.5 mm | 235. mm | 117.5 mm | 15 mm
15 mm
375. mm
345. mm
15 mm

PIXMA®

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP
(Systemic and Contact Fungicide)

Read enclosed leaflet before use. Chemical Composition: Carbendazim Technical (based on 98% w/w a.i.): 12.25% w/w, Mancozeb Technical (based on 85% w/w a.i.): 74.12% w/w, Sodium Salt of alkyl aryl sulfonate: 2.00% w/w,Sodium Salt of alkyl naphthyl sulfonate: 2.00% w/w, Kaolin 9.63% w/w, **Total 100% w/w. Direction Of Use:** Read attached leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuff container and animals flood. 2. Avoid contact with mouth, eye and skin 3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat, and chew anything while spraying 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying 7. Pregnant women should avoid contact with Carbendazim Formulation. 8. The ETU content should not be more than 0.5%. 9. The product should be stored in cool and dry condition. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **First Aid:** 1. If swallowed, include vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eye are contaminated, flush with plenty of saline/clear water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Sweating, headache, lethargy. coughing, sneezing, itching, nausea, vomiting may occur. **Recommendations:** Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP is a systemic and contact fungicide used for seed treatment for the effective control of tikka leaf spot, collar rot and dry root rot diseases of Groundnut, Blast on Paddy, Early blight, Late blight, black scurf on Potato, Blister blight, Grey blight, Red rust, Dieback, Black rot on Tea, Downy mildew, Powdery mildew & Anthracnose on Grape, Powdery mildew & Anthracnose on Mango, Leaf spot, fruit rot and Powdery mildew on Chilli, Downy mildew & leaf blight on Maize, Fruit scab & Powdery mildew on Apple and Tikka leaf spot on Groundnut, Alternaria leaf spot and grey mildew on Cotton, Alternaria leaf spot, Myrothecium leaf spot Pod & stem blight, Anthracnose on Soybean, twig blight , sooty mould, anthracnose fruit rot and anthracnose leaf spot on Mandarin. **Caution :-** Product is toxic to fish and aquatic organism and thus its use may be avoided near aquaculture. **Caution:** 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

पिक्स्मा

कार्बेन्डाजिम १२% + मैनकोजेब ६३% डब्ल्यू. पी.
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फंफूदीनाषक)

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढें। रासायनिक संरचना: कार्बेन्डाजिम टेक्निकल (९८ स.त.): १२.२५% भार/भार, मैनकोजेब टेक्निकल (८५ स.त.): ७४.१२% भार/भार, सोडियम साल्ट-एलकिल एराइल सल्फोनेट २.००% भार/भार, सोडियम साल्ट-एलकिल नेपथाइल सल्फोनेट २.००% भार/भार, केओलिन निष्क्रिय पदार्थ ९.६३% भार/भार, **कुल: १००% भार/भार. उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इस्तेमाल करने से पहलें सलंग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, आँखो, त्वचा को सम्पर्क से बचाये। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करे। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने। ७. गर्भवती महिलाओं को कार्बेन्डाजिम की संरचना के स्पर्श से दूर रहना चाहिए। ८. ई टी यू की मात्रा ०.५ प्रतिशत से ज्यादा नही होनी चाहिए। ९. उत्पाद का ठण्डी व सूखी जगह पर भंडारण करना चाहिए। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उलटी कराए । यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उलटी दारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उलटी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़ों को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी में लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस दारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ला जाये। **लक्षण:** पसीना, सिरदर्द, आलस्य, खांसी, छींक, खुजली, मितली, उल्टी हो सकती है। **उपयोग:** कार्बेन्डाजिम १२% + मेनकोजेब ६३% डब्ल्यू. पी. एक अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक है। जिसका प्रयोग बीजोपचार के रूप में मूंगफली का तना गलन, कोलर रॉट और जड़ गलन, धान में शहसमारी, आलू में अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी, कला कोढ़, चाय में फफोला अंगमारी, भूरापन अंगमारी, लाल गरुआ, सूखा रोग, काली सडन, अंगूर में मृदुरोमिल आसिता, चुर्णी फफूंदी, अंगमारी, आम में चुर्णी फफूंदी, अंगमारी, मिर्च में पत्ती धब्बा, फल सडन, चुर्णी फफूंदी, मक्का में मृदुरोमिल आसिता, पत्ती का अंगमारी, सेब में पामारोग, चुर्णी फफूंदी, मूंगफली में तना गलन, कपास में अल्टरनेरिया पर्ण दाग और भूरापन आसिता, सोयाबीन में अल्टरनेरिया पर्ण दाग, मिरोथेशियम पर्ण दाग, पौड एंड स्टेम ब्लाइट, अंगमारी, मैंडरिन में ट्रिग ब्लाइट, सूटी मोल्ड, अंगमारी फल विलग्न, ऐन्थ्राक्नोज पर्ण चिति रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है। **सावधान:** उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए जहरीला है और इसका उपयोग मत्स्यपालन के पास करने की अनुमति नहीं है। **चेतावनी:** १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें. २) फसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल ना करें. ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट करें. ४) पॉली हाउसेस और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए-पत्रक देखें.

પિક્સ્મા

કાર્બેન્ડાઝિમ 12%+ મેન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુ.પી.
(અંતઃપ્રવાહી અને સ્પર્શીય ફૂગનાશક)

ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો. રાસાયણિક સંરચના: કાર્બેન્ડાઝિમ ટેક્નિકલ (95 એ.આઈ.): 12.25%, મેન્કોઝેબ ટેક્નિકલ (85 એ.આઈ.): 74.12% ભાર/ ભાર, સોડિયમ સોલ્ટ– આલ્કાઇલ એરાઇલ સલ્ફોનેટ 2.00% ભાર/ભાર, સોડિયમ સોલ્ટ– આલ્કાઇલ નેપ્થાઇલ સલ્ફોનેટ 2.00% ભાર/ભાર, કેઓલિન નિષ્ક્રિય પદાર્થ 9.63% ભાર/ભાર, **કુલ: 100% ભાર/ભાર. ઉપયોગ માટે નિર્દેશ:** ઉપયોગ કરવા પૂર્વે સંલગ્ન લીફલેટ વાંચો. **પ્રયોગકર્તાઓ માટે સાવધાની:** 1. ખાદ્યસામગ્રી, ખાદ્યસામગ્રીનાં ખાલી વાસણો અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. 2. મોઢું, આંખો, ત્વચા સાથે સંપર્કથી બચો. 3. છંટકાવની બાષ્પને શ્વાસ દ્વારા અંદર જવાથી બચો. હવાની દિશામાં છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરનાં અંગોને સારી રીતે ધુઓ. 5. છંટકાવ સમયે ખાવું, પીવું, ચગળવું કે ધૂમ્રપાન નહીં કરવું જોઇએ. 6. છંટકાવ કરતી વખતે અથવા મિશ્રણ કરવા સમયે પૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો. 7. ગર્ભવતી મહિલાઓએ કાર્બેન્ડાઝિમની સંરચનાના સ્પર્શથી દૂર રહેવું જોઇએ. 8. ઈટીયુની માત્રા 0.5 ટકાથી વધુ નહીં હોવી જોઇએ. 9. ઉત્પાદની ઠંડી અને સૂકી જગ્યામાં સંગ્રહ કરવું જોઇએ. **વિષનાશક:** કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક નથી. લક્ષણ અનુસાર ઈલાજ કરો. **પ્રાથમિક ચિકિત્સા:** 1. જો પેટમાં જાય તો ગળાની પાછળ ગલગલી કરીને ઊલટી કરાવો. આ ક્રિયા ત્યાં સુધી દોહરાવતા રહો જ્યાં સુધી ઊલટી દ્વારા નીકળતો પદાર્થ સાફ નહીં થાય. જો દર્દી બેભાન હોય તો ઊલટી નહીં કરાવો. 2. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થાય તો દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો અને દૂષિત ત્વચાને ભરપૂર પાણી અને સાબુથી ધોઈ નાખો. 3. જો આંખો દૂષિત થઈ જાય તો તેને પૂરતી માત્રામાં સલાઈન/ સ્વચ્છ પાણીમાં લગભગ 10–15 મિનિટ સુધી ધુઓ. 4. જો શ્વાસમાં જાય તો દર્દીને શુદ્ધ હવામાં બહાર લાવો. **લક્ષણો:** પસીનો, માથામાં દર્દ, બેચેની, ખાંસી, છીંક, ખંજવાળ, ઊબકા, ઊલટી થઈ શકે છે. **ઉપયોગ:** કાર્બેન્ડાઝિમ 12%+ મેન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુ.પી. એક અંતઃપ્રવાહી અને સ્પર્શીય ફૂગનાશક છે, જેનો પ્રયોગ બીજોપચારના રૂપમાં મગફળીમાં ડાળખી બેલ્ક, કોલર રોટ અને જડ બેલ્ક, ડાંગરમાં શહસમારી, બટેટામાં વહેલી અંગમારી, પાછેતી અંગમારી, કલા કોઢ, ચામાં ફૂગી અંગમારી, ભૂરાપણું અંગમારી, લાલ ગેરૂ, સૂકો રોગ, ડાળો સડો, દ્રાક્ષમાં મૃદુરોમિલ છારો, ભૂકી છારો, અંગમારી, કેરીમાં ચુર્ણી ફૂગ, અંગમારી, મરચામાં પાન ધબ્બા, ફળ સડો, ચુર્ણી ફૂગ, મકાઈમાં મૃદુરોમિલ છારો, પાનની અંગમારી, સફરજનમાં પામારોગ, ચુર્ણી ફૂગ, મગફળીમાં ડાળખી બેલ્ક, કપાસમાં આલ્ટરનેરિયા પાર્ણિય ડાઘ અને ભૂરાપણું અંગમારી, સોયાબીનમાં આલ્ટરનેરિયા પર્ણીય ડાઘ, મિરોથેશિયમ પર્ણીય ડાઘ, પૌડ અને સ્ટેમ બ્લાઇટ, અંગમારી, મેન્ડરિનમાં ટ્રિવગ બ્લાઇટ, સૂટી મોલ્ડ, અંગમારી ફળ વિલગ્ન, એન્થ્રેકનોઝ પર્ણીય ચિતી રોગોને પ્રભાવશાળી નિયંત્રણ માટે કરાય છે. **સાવધાન:** ઉત્પાદન માછલી અને સમુદ્રિ જીવો માટે ઝેરી છે અને તેનો ઉપયોગ મત્સ્યપાલનની નજીક કરવાની મંજૂરી નથી. **સાવચેતીનું નિવેદન:** 1. લેબલ અને પત્રકો પર ઉલ્લેખિત સિવાયના પાક અને જંતુઓ પર ઉપયોગ નહીં કરો. 2. લણણી પશ્ચાત છંટકાવ માટે ઉપયોગ નહીં કરવો જોઇએ. 3. ઉપયોગ પછી ડબ્બા પત્રકમાં નિર્દેશ અનુસાર નાશ કરો, 4. પોલી હાઉસીસ અને બંધિયાર જગ્યા માટે નિર્દેશ અને માત્રા– પત્રક જુઓ.

PIXMA®

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP

पिक्स्मा

कार्बेन्डाजिम १२% + मैनकोजेब ६३% डब्ल्यू. पी.

पिक्स्मा | પિક્સ્મા



SYSTEMIC AND CONTACT FUNGICIDE
अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक

Net Content 1 kg
शुद्ध मात्रा १ कि ग्रा

ALBAUGH™
your alternative

Regn. No. : CIR-228850/2022-Carbendazim + Mancozeb (WP) (442)-975
पंजी. नं. / २ज्ञि.नं.: सीआयआर-२२८८५०/२०२२-कार्बेन्डाजिम + मैनकोजेब (डब्ल्यू. पी.) (४४२)-९७५

Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / ઉ.લા.ન.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता एवं विपणनकर्ता :
मे. रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory : G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli, Dist.-Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date / समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:

Maximum retail price ₹: inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ : सभी करों सहित
વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત ₹: કરવેરા સાથે

Unit Sale price per gm

Net Content 1 kg **शुद्ध मात्रा १ कि ग्रा**

® - Registered Trademark

For agriculture use only.
कृषि उपयोग के लिए।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।



PIXMA®

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP
(Systemic and Contact Fungicide)

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP is a systemic and contact fungicide used for seed treatment for the effective control of tikka leaf spot, collar rot and dry root rot diseases of Groundnut, Blast on Paddy, Early blight, Late blight, black scurf on Potato, Blister blight, Grey blight, Red rust, Dieback, Black rot on Tea, Downey mildew, Powdery mildew & Anthracnose on Grape, Powdery mildew & Anthracnose on Mango, Leaf spot, fruit rot and Powdery mildew on Chilli, Downey mildew & leaf blight on Maize, Fruit scab & Powdery mildew on Apple and Tikka leaf spot, Collar rot and Dry root rot on Groundnut.

Caution: Product is toxic to fish and aquatic organism and thus its use may be avoided near aquaculture.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Dosage/HA Formulation (gm)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Apple	Fruit scab & Powdery mildew	0.19%	0.25%	As required depending on crop canopy	20
Chilli	Leaf spot, fruit rot and powdery mildew	563	750	500	3
Cotton	Alternaria leaf spot and grey mildew	180+945	1500	500	71
Grape	Downy mildew, powdery mildew, anthracnose	0.11%	0.15%	As required depending on crop canopy	7
Groundnut	Leaf spot, blast	375	500	500	72
Groundnut	Tikka leaf spot, Collar rot & Dry root rot	1.88	2.5	0	0 seed treatment
Maize	Downey mildew & Leaf blight	120+630	1000	500	37
Mandarin	Twig blight, Sooty mould, anthracnose fruit rot and anthracnose leaf spot	0.23%	0.30%	500	30
Mango	Powdery mildew, anthracnose	0.11%	0.15%	As required depending on crop canopy	7
Paddy	Blast	563	750	750	57
Potato	Early blight, Late blight, Black scurf	1312.5	1750	500	47
Soybean	Alternaria leaf spot, Myrothecium leaf spot Pod & stem blight, Anthracnose	150+ 787.5	1250	500	31
Tea	Blister blight, Grey blight, Red rust, Die-back, Black rot	937.5	1250	250-500	7

Direction of Use: Spray by using high volume sprayer viz. Knapsack sprayer.

Time of Application: The product should be sprayed immediately on appearance of disease symptoms. As per recommendation, mix the pesticides and water at right dosage and spray. Before spraying the pesticides, It's suspension should be mixed well by a wooden stick.

Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2.Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

CAUTION FOR WORKERS/USERS: while using fungicide workers/users must wear full protective clothing like long sleeved shirt, long paint, chemical resistant gloves, shoes, goggles hat and mask.

Symptoms of Poisoning: Sweating, headache, lethargy, coughing, sneezing, itching, nausea, vomiting may occur.

First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote: No antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container: 1. Packages or surplus material and washing from the machines and container shall be disposed off in such a manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages should not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages should be burried away from habitation and source of water.

Storage Conditions: 1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing articles or shall kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and sufficient dimension.

Chemical Composition:

Carbendazim Technical (based on 98% w/w a.i.)	12.25% w/w
Mancozeb Technical (based on 85% w/w a.i.)	74.12% w/w
Sodium Salt of alkyl aryl sulfonate	2.00% w/w
Sodium Salt of alkyl naphthyl sulfonate	2.00% w/w
Keolin	9.63% w/w
Total:	**100.00% w/w**

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

English

पिक्समा

कारबेन्डाजिम 12% + मैनकोजेब 63% घुलनशील पाउडर
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फंफूदीनाशक)

कारबेन्डाजिम 12% + मैनकोजेब 63% डब्ल्यू.पी. एक अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक है। जिसका प्रयोग बीजोपचार के रूप में मूंगफली का तना गलन, कोलर रॉट और जड़ गलन, धान में शहसमारी, आलू में अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी, कला कोढ़, चाय में फफोला अंगमारी, भूरापन अंगमारी, लाल गरुआ, सूखा रोग, काली सडन, अंगूर में तुलसीता, चूर्णी फफूंदी, अंगमारी, आम में चूर्णी फफूंदी, अंगमारी, मिर्च में पत्ती धब्बा, फल सडन, चूर्णी फफूंदी, मक्का में मृदुरोमिल आसिता, पत्ती का अंगमारी, सेब में पामारोग, चूर्णी फफूंदी, मूंगफली में तना गलन, कोलर रॉट और जड़ गलन रोगों के प्रभावी नियत्रण के लिए किया जाता है।

सावधान: उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए जहरीला है और इसका उपयोग मत्स्यपालन के पास करने की अनुमति नहीं है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.त. (ग्राम)	मात्रा संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
सेब	पामा रोग, चूर्णी फफूंदी	0.19%	0.25%	फसल की कैनोपी के अनुसार आवश्यक मात्रा	20
मिर्च	पत्ता धब्बा, फल विगलन रोग, चूर्ण फफूंदी	563	750	500	3
कपास	अल्टरनेरिया पर्ण दाग और भूरापन आसिता	180+ 945	1500	500	71
अंगूर	मृदुरोमिल आसिता रोग, चूर्णीता आसिता, एन्थ्रेक्नोज	0.11%	0.15%	फसल की कैनोपी के अनुसार आवश्यक मात्रा	7
मूंगफली	पत्ती धब्बा, सहसामारी	375	500	500	72
मूंगफली	टिक्का रोग, कॉलर रॉट, जड़ गलन	1.88	2.5	0	बीजोपचार
मक्का	मृदुरोमिल आसिता, पत्ती का अंगमारी	120+ 630	1000	500	37
मैंडारिन	टिप्पण ब्लाइट, सूटी मोल्ड, एन्थ्रेक्नोज फल विगलन, एन्थ्राक्नोज पर्ण चित्ती	0.23%	0.30%	500	30
आम	चूर्णीता आसिता, एन्थ्राक्नोज	0.11%	0.15%	फसल की कैनोपी के अनुसार आवश्यक मात्रा	7
धान	सहसामारी	563	750	750	57
आलू	अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ब्लैक एन्थ्राक्नोज	1312.5	1750	500	47
सोयाबीन	अल्टर नेरिया पर्ण दाग, मिरोथेसियम पर्ण दाग, पौड एंड स्टेम ब्लाइट, एन्थ्राक्नोज	150+ 787.5	1250	500	31
चाय	ब्लिस्टर ब्लाइट, ग्रे ब्लाइट, रेड रस्ट, डाई बैक, ब्लैक रॉट	937.5	1250	250–500	7

उपयोग के लिये दिशा–निर्देश: पीठ पर लादने वाले छिड़काव कारक यंत्र तथा उच्च आयतन वाले छिड़काव यंत्र का प्रयोग करें।

प्रयोग का समय: इस फफूंदनाशक का प्रयोग रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत छिड़काव करें। निर्देश अनुसार फफूंदनाशक एवं पानी का उचित मात्रा में मिश्रण करके छिड़काव करें। फफूंदनाशक के छिड़काव से पहले, इसके घोल को अच्छी तरह एक लकड़ी द्वारा मिला लें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियां: 1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुंह, आंखों और त्वचा को सम्पर्क से बचाये। 3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोऐं। 5 छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

कामगारों और उपयोग कर्ताओं के लिए चेतावनी: फफूंदीनाशक से काम करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े जैसे पूरी बाजू की कमीज, लम्बी पैन्ट, जूते, चश्मा, मुखौटा, टोप, रसायन रोधी दस्ताने पहनने चाहिए।

विष के लक्षण: पसीना, सिरदर्द, आलस्य, खांसी, छींक, खुजली, मितली, उल्टी हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: (1) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। (2) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़ों को उतार दे, दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोऐं। (3) यदि आंखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी में लगभग 10–15 मिनट तक धोऐं। (4) यदि सांस द्वारा अंदर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाऐं।

पौधविषाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह फफूंदीनाशक पौधविषाक्त नहीं है।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: 1. फफूंदनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बे या पात्रों को तोडकर धातुओं को दूर जमीन में गाड देना चाहिए। 2. खाली डिब्बों को बाहर न रखिए ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके। 3. डिब्बों या बची हुई फफूंदनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार कि कभी इससे आस–पास की खेती, पीने का पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें: 1. फफूंदनाशक रखे हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे या अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या अलमारी में ताला कुंजी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। 2. जिस कमरे या अलमारी में फफूंदनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त हवादार तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे कि फफूंदनाशक के माप से प्रदूषण होने का डर न हो।

रासायनिक संरचना:

कारबेन्डाजिम टेक्निकल (98% स.त. पर आधारित)	12.25% भार/भार
मैनकोजेब टेक्निल (85% स.त. पर आधारित)	74.12% भार/भार
सोडियम सॉल्ट–एलकिल एराइल सल्फोनेट	2.00% भार/भार
सोडियम सॉल्ट–एलकिल नेफथालिन सल्फोनेट	2.00% भार/भार
केओलीन निष्क्रिय पदार्थ	9.63% भार/भार
कुल	**100.00% भार/भार**

सावधानियां कथन: 1. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक–पर्ची देखें।

Hindi

પિક્સમા

કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુ.પી.
(આંતરપ્રવાહી અને સ્પર્શીય ફુંગનાશક)

કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુ.પી. એક આંતરપ્રવાહી અને સ્પર્શીય ફુંગનાશક છે અને તેનો ઉપયોગ મગફળીના પાકમાં થતા ટીકા, લીફ સ્પોટ, કોલર રોટ અને ડ્રાય રૂટ રોટ; ડાંગરના પાકમાં થતા બ્લાસ્ટ; બટાકાના પાકમાં થતા અર્લી બ્લાઇટ, લેટ બ્લાઇટ અને બ્લેક સ્કર્ફ; ચાના પાકમાં થતા બ્લિસ્ટર બ્લાઇટ, ગ્રે બ્લાઇટ, રેડ રસ્ટ, ડાઇ બેક અને બ્લેક રોટ; દ્રાક્ષના પાકમાં થતા ડાઉની મિલ્ડ્યુ, પાવડરી મિલ્ડ્યુ અને એન્થ્રેકનોઝ; કેરીના પાકમાં થતા પાવડરી મિલ્ડ્યુ અને એન્થ્રેકનોઝ; મરચાંના પાકમાં થતા લીફ સ્પોટ, ફ્રૂટ રોટ અને પાવડરી મિલ્ડ્યુ; મકાઈના પાકમાં થતા ડાઉની મિલ્ડ્યુ અને લીફ બ્લાઇટ; સફરજનના પાકમાં થતા ફ્રૂટ સ્કેબ અને પાવડરી મિલ્ડ્યુ તેમજ મગફળીના પાકમાં થતા ટીકા લીફ સ્પોટ, કોલર રોટ અને ડ્રાય રૂટ રોટ વગેરે પર અસરકારક અંકુશ માટે બીજોપચાર તરીકે કરવામાં આવે છે.

ઉપયોગ:

પાક	જીવાતનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સ.ત. (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (ગ્રામ)	પાણીની માત્રા (લી.)	પાક પરના બે છંટકાવ વચ્ચે રહેવો અંતર (દિવસો)
સફરજન	ફ્રૂટ સ્કેબ અને પાઉડરી મિલ્ડ્યુ	0.19%	0.25%	પાકની કેનોપી અનુસાર જરૂરી માત્રા લાગુ પડતું નથી	20
મરચાં	લીફ સ્પોટ, ફ્રૂટ રોટ અને પાઉડરી મિલ્ડ્યુ	563	750	500	3
કપાસ	અલ્ટરનેરીયા લીફ સ્પોટ અને ગ્રે મિલ્ડ્યુ	180+ 945	1500	500	71
દ્રાક્ષ	ડાઉની મિલ્ડ્યુ, પાઉડરી મિલ્ડ્યુ, અને એન્થ્રેકનોઝ	0.11%	0.15%	પાકની કેનોપી અનુસાર જરૂરી માત્રા લાગુ પડતું નથી	7
મગફળી	લીફ સ્પોટ, બ્લાસ્ટ	375	500	500	72
મગફળી	ટિક્કા લીફ સ્પોટ, કોલર રોટ અને ડ્રાય રૂટ રોટ	1.88	2.5	0	બીજોપચાર
મકાઈ	ડાઉની મિલ્ડ્યુ અને લીફ બ્લાઇટ	120+ 630	1000	500	37
મેન્ડેરિન	ટ્વિગ બ્લાઇટ, સૂટી મોલ્ડ, એન્થ્રેકનોઝ ફ્રૂટ રોટ અને એન્થ્રેકનોઝ લીફ સ્પોટ	0.23%	0.30%	500	30
કેરી	પાઉડરી મિલ્ડ્યુ અને એન્થ્રેકનોઝ	0.11%	0.15%	પાકની કેનોપી અનુસાર જરૂરી માત્રા લાગુ પડતું નથી	7
ડાંગર	બ્લાસ્ટ	563	750	750	57
બટાકા	અર્લી બ્લાઇટ, લેટ બ્લાઇટ અને બ્લેક સ્કર્ફ	1312.5	1750	500	47
સોયાબીન	અલ્ટરનેરિયા લીફ સ્પોટ, માયરોથેસિયમ લીફ સ્પોટ પોડ એન્ડ સ્ટેમ બ્લાઇટ, એન્થ્રેકનોઝ	150+ 787.5	1250	500	31
ચા	બ્લિસ્ટર બ્લાઇટ, ગ્રે બ્લાઇટ, રેડ રસ્ટ, ડાઇ બેક અને બ્લેક રોટ	937.5	1250	250-500	7

ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ: આ માટે પીઠ પર લાદવાના છંટકાવ યંત્ર કે તેથી વધુ આયતનના છંટકાવ યંત્રનો પ્રયોગ કરો.

ઉપયોગનો સમય: રોગનાં લક્ષણો જણાય કે તરત જ આ જીવાતનાશકનો પ્રયોગ કરો. નિર્દેશ અનુસાર આ જીવાતનાશક અને પાણીનું યોગ્ય મિશ્રણ કરીને પ્રયોગ કરો. છંટકાવ કરતાં પહેલાં આ મિશ્રણને લાકડી વડે બરાબર હલાવો.

વાપનાર માટે સાવચેતી: 1. ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. 2. મુખ, ત્વચા અને આંખ ને સંપર્કથી બચાવો. 3. છંટકાવના શ્વાસ માં જાવાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને ચામડીને ધોઈ લેવા. 5. છાંટણ વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો. 6. વાપરનારે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા જોઇએ.

વપરાશકાર/કર્મચારીઓ માટે સાવચેતી: આ જીવાતનાશકનું મિશ્રણ બનાવતી અને તેનો છંટકાવ કરતી વખતે આખી બાંયનું શર્ટ, પેન્ટ, રસાયણ વિરોધી મોજાં,બૂટ, ટોપી, હેટ અને નકાબ જરૂર પહેરો.

ઝેરનાં લક્ષણો: પરસેવો, માથાનો દુઃખાવો, આળસ, ઉધરસ, છીંક, ખંજવાળ, ઉલ્ટી વગેરે થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક ચિકિત્સા: 1. ગળાની પાછળ ગલીપચી કરીને ઉલ્ટી કરાવો. જ્યાં સુધી સાફ ઉલ્ટી ના થાય, એમ ચાલુ રાખો. 2. પ્રભાવિત ચામડી અને કપડાંનું પાણીથી ધુઓ. 3. આંખોમાં જાય તો ચોખ્ખા પાણી થી વધારે માત્રામાં 10-15 મિનિટ સુધી ધુઓ. 4. શ્વાસમાં ગઈ હોય તો દરદીને ખુલ્લી હવામાં લઈ જાવ.

છોડની વિષયુક્તતા: જરૂરી માત્રામાં ઉપયોગ કરવાથી છોડને ઝેર ચઢતું નથી.

વિષનાશક: કોઈ વિષનાશક જણાતું નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ: 1. ખાલી ડબ્બાઓને તોડીને વસ્તીથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ. 2. ખાલી ડબ્બાઓનો ફરીથી ઉપયોગ થતો રોકવા માટે એમને બહાર ન ફેંકશો. 3. વધેલા ફુગનાશક તથા મશીન વગેરેની સફાઈ કરેલા પાણીને એ રીતે નિકાલ કરો કે વાતાવરણ અને જળ પ્રદૂષિત ના થાય.

સંગ્રહ: 1. ફુગનાશક ડબ્બાનો સંગ્રહ, જુદા ઓરડા કે સ્થાનમાં, અન્ય વસ્તુઓ, ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો રાખવાનાં ઓરડાથી દૂર કરવો જોઈએ. કે ફુગનાશકનું પ્રમાણ અને પ્રકાર પ્રમાણે ડબ્બાઓને અલગ કબાટમાં તાળાવાળીમાં બંધ કરીને રાખો. 2. ફુગનાશકનો સંગ્રહ ઓરડા કે સ્થાન હવા-ઉજાસવાળા, મજબૂત અને પૂરતા લંબાઈ પહોળાઇવાળો હોવો જોઇએ, જેનાથી ભાષ્પ પ્રદૂષણ ન થાય.

રાસાયણિક બનાવટ:

કાર્બેન્ડાઝિમ ટેકનીકલ (98% સ.ત. પર આધારિત)	12.25% ભાર/ભાર
મેન્કોઝેબ ટેકનીકલ (85% સ.ત. પર આધારિત)	74.12% ભાર/ભાર
સોડિયમ સોલ્ટ-એલકિલ એરાઈલ સલ્ફોનેટ	2.00% ભાર/ભાર
સોડિયમ સોલ્ટ-એલકિલ નેપ્થાઈલ સલ્ફોનેટ	2.00% ભાર/ભાર
કેયાલીન નિષ્ક્રિય પદાર્થ	9.63% ભાર/ભાર
કુલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

ચેતવણી: 1. લેબલ અને લિફ્લેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો વિલ્હેટમાં સૂચવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4. પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઇડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફ્લેટ વાંચો.

Gujarati

ਪਿਕਸਮਾ

ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ 12% + ਮੈਂਕੋਜ਼ੇਬ 63% ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.
(ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਫੁੰਗਨਾਸ਼ਕ)

ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ 12 ਫੀਸਦੀ + ਮੈਂਕੋਜ਼ੇਬ 63 ਫੀਸਦੀ ਡਬਲਿਯੂ.ਪੀ. ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਾ ਪੱਤੀ ਦਾਗ, ਕਾਲਰ ਰੌਟ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜੜ੍ਹ ਸੜਨ, ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਬਲਾਸਟ, ਆਲੂਚੀ ਅਗੇਤੀ ਰੁੱਗੀ, ਪਛੇਤੀ ਰੁੱਗੀ, ਬਲੈਕ ਸਕੁਰ, ਚਾਹ 'ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਬਲਾਇਟ, ਗ੍ਰੇ ਬਲਾਇਟ, ਰੈਡ ਰਸਟ, ਡਾਇਬੈਕ, ਬਲੈਕ ਰੌਟ, ਅੰਗੂਰ 'ਤੇ ਰੋਏਦਾਰ ਉੱਲੀ, ਧੁਰੋਦਾਰ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਐਂਥਰੈਕਨੋਜ਼, ਅੰਬ 'ਤੇ ਧੁਰੋਦਾਰ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਐਂਥਰੈਕਨੋਜ਼, ਮਿਰਚ 'ਤੇ ਪੱਤੀ ਦਾਗ, ਫਲ ਸੜਨ ਅਤੇ ਧੁਰੋਦਾਰ ਉੱਲੀ, ਮੱਕੀ 'ਤੇ ਰੋਏਦਾਰ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਲੀਫ ਬਲਾਇਟ, ਸੇਬ 'ਤੇ ਫਲ ਦਾਗ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਪੱਤੀ ਦਾਗ, ਕਾਲਰ ਰੌਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜੜ੍ਹ ਸੜਨ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜਿਆ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ।

ਉਪਯੋਗ:

ਫ਼ਸਲ	ਕੀਟ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਨਾਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾ.)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਸੇਬ	ਪਾਮਰੇਰਾ ਅਤੇ ਧੁਰੋਦਾਰ ਉੱਲੀ	0.19%	0.25%	ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੈਨੋਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾਗੂ ਪਰ੍ਤੂ ਨਹੀਂ	20
ਮਿਰਚ	ਪੱਤੀ ਧੱਬਾ, ਫਲ ਸੜਨ ਅਤੇ ਧੁਰੋਦਾਰ ਉੱਲੀ	563	750	500	3
ਕਪਾਸ	ਅਲਟਰਨੇਰਿਆ ਪੱਤੀ ਦਾਗ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਿਲ੍ਡ੍ਯੂ	180+ 945	1500	500	71
ਦ੍ਰਾਖ਼	ਡਾਊਨੀ ਮਿਲ੍ਡ੍ਯੂ, ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲ੍ਡ੍ਯੂ ਅਤੇ ਐਂਥ੍ਰੈਕਨੋਜ਼	0.11%	0.15%	ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੈਨੋਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾਗੂ ਪਰ੍ਤੂ ਨਹੀਂ	7
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਲੀਫ ਸਪੋਟ, ਬ੍ਲਾਸ੍ਟ	375	500	500	72
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਟਿੱਕਾ ਲੀਫ ਸਪੋਟ, ਕੋਲਰ ਰੋਟ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਏ ਰੂਟ ਰੋਟ	1.88	2.5	0	ਬੀਜੋਪਚਾਰ
ਮਕਈ	ਡਾਊਨੀ ਮਿਲ੍ਡ੍ਯੂ ਅਤੇ ਲੀਫ ਬ੍ਲਾਇਟ	120+ 630	1000	500	37
ਮੈਂਡੇਰਿਨ	ਟ੍ਵਿਗ ਬ੍ਲਾਇਟ, ਸੂਟੀ ਮੋਲ੍ਡ, ਐਂਥ੍ਰੈਕਨੋਜ਼ ਫ੍ਰੂਟ ਰੋਟ ਅਤੇ ਐਂਥ੍ਰੈਕਨੋਜ਼ ਲੀਫ ਸਪੋਟ	0.23%	0.30%	500	30
ਅੰਬ	ਧੁਰੋਦਾਰ ਉੱਲੀ, ਐਂਥਰਾਕਨੋਜ਼	0.11%	0.15%	ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੈਨੋਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾਗੂ ਪਰ੍ਤੂ ਨਹੀਂ	7
ਝੋਨਾ	ਸਹਿਸਮਾਰੀ	563	750	750	57
ਆਲੂ	ਅਗੇਤੀ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਪਿਛੇਤੀ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਕਾਲਾ ਕੋਂਗੂ	1312.5	1750	500	47
ਸੋਇਆਬੀਨ	ਅਲਟਰਨੇਰੀਆ ਪੱਤੀ ਦਾਗ, ਮਾਇਰੋਥੇਸਿਅਮ ਪੱਤੀ ਦਾਗ ਪੌਡ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਬ੍ਲਾਇਟ, ਐਂਥ੍ਰੈਕਨੋਜ਼	150+ 787.5	1250	500	31
ਚਾਹ	ਬ੍ਲਿਸਟਰ ਬ੍ਲਾਇਟ, ਗ੍ਰੇ ਬ੍ਲਾਇਟ, ਰੇਡ ਰਸ੍ਟ, ਡਾਇ ਬੈਕ, ਬ੍ਲੈਕ ਰੌਟ	937.5	1250	250-500	7

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ: ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਲੱਦਣ ਵਾਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਇਤਨ ਵਾਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਯੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਇਸ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿੱਸਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: 1. ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੀਆਂ ਜੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੋ। 2. ਮੁੰਹ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। 3. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀਓ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। 4. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਧੋਵੋ। 5. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸਮੇ ਧੂਮਪਾਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। 6. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇ ਜਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰਖਿਅੰਤ ਕਪੜੇ ਪਾਓ।

ਇਸਤੇਮਾਲਕਰਤਾ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਪੂਰੀ ਪੈਂਟ, ਰਸਾਇਣ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਸਤਾਨੇ, ਜੁੱਤੇ, ਰੰਗੀਨ ਚਸ਼ਮੇ, ਟੋਪੀ, ਹੈਟ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਪਸੀਨਾ, ਸਿਰਦਰਦ, ਆਲਸ

పిక్స్‌మా

కార్బెండాజిమ్ 12% + మాంకోజెబ్ 63% డబ్ల్యూ.పీ.

(అంకర్బ్యాహా మరియు స్పరణీయమైన శిలీంధ్రనాశని)

కార్బెండాజిమ్ 12 శాతం + మాంకోజెబ్ 63 శాతం డబ్ల్యూ.పీ. ఆవేది అంకర్బ్యాహా మరియు స్పరణీయమైన శిలీంధ్రనాశని. వేరు తెగుళ్ల వంటను ఆశించే టొన్ము ఆకు మచ్చ, కాలర్ కుళ్ళు మరియు వ్రై వేరు కుళ్ళు. వరి వంటను ఆశించే వ్రాస్తె. బంగాళ దుంప వంటను ఆశించే ఎర్లీ బ్లైట్, లేట్ బ్లైట్, వ్రాస్తె స్కర్ఫ్. తేయాకు వంటను ఆశించే బ్లిస్టర్ బ్లైట్, గ్రే బ్లైట్, ఎర్ర కుళ్ళు, బ్లై బ్యాక్, బ్లాక్ రాట్. ద్రాక్ష వంటను ఆశించే బూజు తెగులు. బాదం వద్ద తెగులు, ఆంత్రక్నోజ్. మామిడి వంటను ఆశించే బూడిద తెగులు, ఆంత్రక్నోజ్. మిరప వంటను ఆశించే ఆకుమచ్చ వంటి కుళ్ళు మరియు బూడిద తెగులు. మొక్కజొన్న వంటను ఆశించే టిప్ బ్లైట్. వాము మిల్‌డ్యూ. యూసీ వంటను ఆశించే బ్రూల్ స్పాట్ మరియు పొదరీ మిల్‌డ్యూ మరియు వేరు శిరగ వంటను ఆశించే టొన్ము ఆకు మచ్చ, కాలర్ కుళ్ళు మరియు టొన్ము వేరు కుళ్ళు వంటను నియంత్రించడానికి సమర్థవంతంగా పత్రనాలను శుద్ధి చేసే శిలీంధ్రనాశని.

సిఫారసు:

వంట	కీలకమైన సాధారణ నామం	మోతాదు/స్ప్రేకుకి ఏ.ఐ. (గ్రా.)	మాత్రికి మి.లీ. (గ్రా.)	నీటిలో విభజించు (లీ.)	చివరి సిరోలను కోయడానికి ముందు వేచి ఉండే రోజుల సంఖ్య (రోజులు)
యాపిల్	బ్రూట్ స్పాట్ మరియు బూజు తెగులు	0.19%	0.25%	వంట వంటిరి వై ఆధారపడి కావలిన్న విధంగా	20
మిర్చి	ఆకు మచ్చ, వంట కుళ్ళు మరియు బూజు తెగులు	563	750	500	3
వ్రెత్తి	ఆర్డరాంయా ఆకుమచ్చ మరియు గ్రే మిల్‌డ్యూ	180+ 945	1500	500	71
ద్రాక్ష	ఆకు ఎండు తెగులు, బూజు తెగులు, ఆంత్రక్నోజ్	0.11%	0.15%	వంట వంటిరి వై ఆధారపడి కావలిన్న విధంగా	7
వేరుశెనగ	ఆకుమచ్చ, టొన్ము	375	500	500	72
వేరుశెనగ	టొన్ము ఆకు మచ్చ, కాలర్ కుళ్ళు మరియు వంట వేరు కుళ్ళు	1.88	2.5	0	విత్తనాలను శుద్ధి చేయడం
మొక్కజొన్న	ఆకు ఎండు తెగులు, బూజు తెగులు	120+ 630	1000	500	37
మాంచరిస్	బ్లైట్ బ్లైట్, సూటీ బ్లాచ్ మరియు ఆంత్రక్నోజ్ వంట కుళ్ళు మరియు ఆంత్రక్నోజ్ ఆకు మచ్చ	0.23%	0.30%	500	30
మామిడి	బూజు తెగులు, ఆంత్రక్నోజ్	0.11%	0.15%	వంట వంటిరి వై ఆధారపడి కావలిన్న విధంగా	7
వరి	అగ్ని తెగులు	563	750	750	57
బంగాళ దుంప	ఆకు మాడు, లేట్ బ్లైట్, బ్లాక్ స్కర్ఫ్	1312.5	1750	500	47
సోయాబీన్	ఆర్డరాంయా ఆకు మచ్చ, మొరోథీసియం లీఫ్ స్పాట్ మరియు స్కేమ్ బ్లైట్, ఆంత్రక్నోజ్	150+ 787.5	1250	500	31
తేయాకు	బ్లిస్టర్ బ్లైట్, గ్రే బ్లైట్, ఎర్ర తెగులు, బ్లై-బ్యాక్, నల్ల కుళ్ళు	937.5	1250	250-500	7

ఆపరేషనింగానికి మార్గదర్శకాలు: ఆశ్రద్ధిత వ్రాయంగల గల స్ప్రేయర్ ఆనగా నాజిల్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌ని ఉపయోగించి ఏపికారి చేయాలి.

వాడవలసిన సమయం: వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే ఉత్పత్తిని ఉపయోగించండి. సిఫారసు ప్రకారం, శిలీంధ్రనాశని ద్రావణం యొక్క సమాన పంపిణీ కోసం ఏపికారి చేయాలి. శిలీంధ్రనాశని ఏపికారి చేయడానికి ముందు, చక్కి క్రిములో దాని ప్రామాణిక్ మొత్తాన్ని కలపాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్థాలు, ఫాలీ ఆహార పదార్థాల కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహారాలకు దూరంగా ఉంచాలి. 2. నోరు, కళ్ళు, చర్మంతో తగులనీయరాదు. 3. ఏపికారి పొగ పీల్చరాదు. గాలి వీచే దిశలో ఏపికారి చేయాలి. 4. ఏపికారి చేసిన తర్వాత కలుషితమైన దుస్తుల్ని ఎండుకు వేరే ఉతుకుల్ని బాగా కడగాలి. 5. ఏపికారి చేసేవప్పుడు మీరి తినరాదు, తాగరాదు, పొగ తాగరాదు, సబలరాదు. 6. విష వాయువుకు వీల్చుకుండ ఉండేందుకు వీలుగా తగిన రీతిలో దుస్తులు వేసుకోవాలి.

పనివారికి/ఉపయోగించే వారికి హెచ్చరిక: శిలీంధ్రనాశిని ఉపయోగించేటప్పుడు పొడవు చేతుల చొక్కా, పొడవు ప్యాంటు, రబ్బరు వెరిదవకి కలిగిన గ్లోవ్స్, బూట్లు, గుగుల్స్, టోపీ మరియు మాస్క్ వంటి పూర్తి రక్షణనిచ్చే దుస్తుల్ని ధరించాలి.

లక్షణాలు: చెమటలు పొయటం, తలనొప్పి, బద్దకం, దగ్గు, తుమ్ములు, దురద, చికారం, వాంతులు కలగవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మత్త వెనుక చెక్కిలిలిపి ఫిల్లో వాంతి చేయించండి మందు బయటకు వచ్చే వరకు వాంతి చేయించండి. 2. శరీరంపై పడితే, ధారాళంగా నీటితో శుభ్రం చేయాలి. 3. మందు కళ్ళలో పడితే 10-15 నిం॥ల పాటు వీటితో కళ్ళు శుభ్రం చేయండి. 4. విష వాయువును పీల్చి వస్తే, ధారాళంగా స్వచ్ఛమైన గాలి వీచే వసతిని ఏర్పరుచుకోవాలి. 5. గుండెపోటు-వంటి 10-15 నిమిషాలకి ఒకసారి ఇవ్వాలి. 6. మత్తుకు స్పృహకోల్పోయినట్లయితే, నోరుమూసి ఉన్నట్లయితే, నోరుమూసి ఉన్నట్లయితే, నోరుమూసి ఉన్న