

1 Ltr - 281 x 140 mm

281.00 mm

140.00 mm

ROTRIF SUPER

Thiamethoxam 30% FS

Systemic Insecticide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Thiamethoxam a.i.: 30.00% w/w, Glycerine: 5.10% w/w, Monoazo dye (Irgacil Red C2B): 3.40% w/w, Copolymer of butanol: 4.30% w/w, 1,2-Benzisothiazolin-3-one: 0.20% w/w, Polyethylene glycol: 2.60% w/w, Water: QS % w/w, Total: 100.00% w/w. Crops and Pest Group: Recommended as seed treatment to control Jassids, Aphids and Whitefly in Cotton; Shoot fly in Sorghum and Maize; Termites in Wheat; Jassid in Okra; Thrips, GLH and Whorl Maggot in Rice; Jassid and Thrips in Sunflower; Stem fly in Soybean and Thrips in Chilli Crop. Direction of Use: Read enclosed leaflet carefully before use. Precautions: Do not use cooking utensils for preparing slurry. Use stick for stirring the slurry solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask goggles and boots while mixing. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. First Aid: Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. In case of skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case of eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes. In case of ingestion: Repeatedly administer medical charcoal in a large quantity of water. NOTE: Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. Symptoms: Poisoning may cause symptoms of decrease in spontaneous movement, toxic convulsion and ptosis. Warning: 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area Refer the leaflet. 5. Do not spray during active bee-foraging period of the day. 6. Use with care to avoid air/dust contamination of the cropping area.

रॉट्रीफ सुपर

थायामेथोक्साम ३०% एफएस

अंतर्प्रवाही कीटनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संघटन: थायामेथोक्साम स.ज.: ३०.००% भार/भार, ग्लिसरीन: ५.१०% भार / भार, मोनोआज़ो डाय (इरगैल रेड सी २बी): ३.४०% भार/भार, ब्यूटिलोल् वॉटर कोपोलिमर: ४.३०% भार / भार, १,२-बेन्ज़ीसोथिआज़ोलीन-३-ओन: ०.२०% भार/भार, पॉलीएथिलीन ग्लायकोल: २.६०% भार/भार, पानी: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। फसलें एवं कीट समूह: यह कायम के फसल में होने वाले कीट जैसे तेंपा, माहु और सांठे मक्खी, ज्वार व मक्का की प्रारंभ मक्खी, गोंगू के टीका, चिंटी के तेंपा; धान के चूट, हरा पत्ती का घुस्का व चांगी चोंच, सूरजमुखी के तेंपा व चूट, सोयाबीन के तेंपा मक्खी तथा धान के चूट के बीच उत्रवार द्वारा निरसन के लिए सिफाफिन की जाती है। उपयोग के लिए निर्देश: उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: छिड़काव तैयार करते के लिए छाना पकने के बरत का इस्तेमाल नहीं करिए। छिड़काव के धोल को डिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। त्वचा को छिड़काव सर्पों से बचाव के लिए हस्तगत करें। संस के साथ अंतर लेने और आंखों के संघर्ष से भी बचें। छिड़काव करते समय सुरक्षात्मक कपड़े जैसे मास्क, चप्पल, बूट्स आदि पहनें। उत्पाद को उतारें, खुरी या प्रयोग करते समय धान, गीन या प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और डेर सारे पानी से धोएं। पहने हुए कपड़ों को बदल लें और उन्हें अच्छी तरह से धोएं। विष नाशक: कोई विशेष प्रतिविष नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें। प्राथमिक चिकित्सा: उपस्थित व्यक्ति को प्रथम जगह से हटाकर कार्य का खुली हवा में ले जाए और सावधान से बचाएं। विष बाधा के लक्षण दिखाने पर तुरंत चिकित्सक को बुलाएं। त्वचा में संपर्क पर प्रथम कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। आंखों में चले जाने पर आंखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। प्रभावित विभाग निगल जाने पर पानी में डिट्रिटिन्स कारकोल की काफी मात्रा में घोलेकर खाएं। सूचना: कभी भी सुनिश्चित मोज़ी को छुंने से कुछ भी नहीं देना चाहिए। उट्टी करने की कोशिश न करें। लक्षण: विष के लक्षण से शरीर में डीलान, मिर्चा जैसे डस्टकें और पेटिंग हो सकते हैं। सावधानियां: १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें १२ फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पानी पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद बंद कर दें। ४. पॉलीहाउसिंग और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और सुरक्षा पढ़ें। ५. एक मधुमक्खिवादी दिन की चारा छोड़ अवधि में सक्रिय होती है, तो रो मार करें। ६. फसल क्षेत्र को बाधू धूल प्रदूषण से बचने के लिए सावधानी से प्रयोग करें।

रॉट्रीफ सुपर

थायामेथोक्साम 30% एफएस

अंतर्प्रवाही कीटनाशक

उपयोग करने पर ध्यान से पढ़ें। रासायनिक संघटन: थायामेथोक्साम स.ज.: 30.00% भार/भार, ग्लिसरीन: 5.10% भार/भार, मोनोआज़ो डाय (इरगैल रेड सी २बी): 3.40% भार/भार, ब्यूटिलोल् वॉटर कोपोलिमर: 4.30% भार/भार, 1,2-बेन्ज़ीसोथिआज़ोलीन-३-ओन: 0.20% भार/भार, पॉलीएथिलीन ग्लायकोल: 2.60% भार/भार, पानी: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: 100.00% भार/भार। फसलें एवं कीट समूह: थायामेथोक्साम 30% एफएस से फसल में होने वाले कीट जैसे तेंपा, माहु और सांठे मक्खी, ज्वार व मक्का की प्रारंभ मक्खी, गोंगू के टीका, चिंटी के तेंपा; धान के चूट, हरा पत्ती का घुस्का व चांगी चोंच, सूरजमुखी के तेंपा व चूट, सोयाबीन के तेंपा मक्खी तथा धान के चूट के बीच उत्रवार द्वारा निरसन के लिए सिफाफिन की जाती है। उपयोग के लिए निर्देश: उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: छिड़काव तैयार करते के लिए छाना पकने के बरत का इस्तेमाल नहीं करिए। छिड़काव के धोल को डिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। त्वचा को छिड़काव सर्पों से बचाव के लिए हस्तगत करें। संस के साथ अंतर लेने और आंखों के संघर्ष से भी बचें। छिड़काव करते समय सुरक्षात्मक कपड़े जैसे मास्क, चप्पल, बूट्स आदि पहनें। उत्पाद को उतारें, खुरी या प्रयोग करते समय धान, गीन या प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और डेर सारे पानी से धोएं। पहने हुए कपड़ों को बदल लें और उन्हें अच्छी तरह से धोएं। विष नाशक: कोई विशेष प्रतिविष नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें। प्राथमिक चिकित्सा: उपस्थित व्यक्ति को प्रथम जगह से हटाकर कार्य का खुली हवा में ले जाए और सावधान से बचाएं। विष बाधा के लक्षण दिखाने पर तुरंत चिकित्सक को बुलाएं। त्वचा में संपर्क पर प्रथम कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। आंखों में चले जाने पर आंखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। प्रभावित विभाग निगल जाने पर पानी में डिट्रिटिन्स कारकोल की काफी मात्रा में घोलेकर खाएं। सूचना: कभी भी सुनिश्चित मोज़ी को छुंने से कुछ भी नहीं देना चाहिए। उट्टी करने की कोशिश न करें। लक्षण: विष के लक्षण से शरीर में डीलान, मिर्चा जैसे डस्टकें और पेटिंग हो सकते हैं। सावधानियां: १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें १२ फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पानी पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद बंद कर दें। ४. पॉलीहाउसिंग और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और सुरक्षा पढ़ें। ५. एक मधुमक्खिवादी दिन की चारा छोड़ अवधि में सक्रिय होती है, तो रो मार करें। ६. फसल क्षेत्र को बाधू धूल प्रदूषण से बचने के लिए सावधानी से प्रयोग करें।

रॉट्रीफ सुपर रॉट्रीफ सुपर

ROTRIF SUPER Thiamethoxam 30% FS रॉट्रीफ सुपर थायामेथोक्साम ३०% एफएस

Keep out of the reach of children. खतरा DANGER भय बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

INSECTICIDE कीटनाशक

Net Content 1 Litre शुद्ध मात्रा १ लीटर



Regn. No.: CIR-230111/2022-Thiamethoxam (FS) (442)-1041
पंजी नं./रजि. नं., सीआईआर-२३०१११/२०२२-थायामेथोक्साम (एफएस) (४४२)-१०४१
Mfg. Lic. No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं./उ.ला.नं., एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांतक्रुज (पू), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Tal.: Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।
For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No.:
बैच नं.:
अथ नं.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख:
Exp. Date :
समाप्त तिथि :
अवधि समाप्त तिथि:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम बुद्धा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹
वधुधुं वधु शीतल डिमेंट इश्येस साथै
Unit sale price : ₹

Net Content : 1 Litre शुद्ध मात्रा : १ लीटर
Registered Trademark
Re-entry: 24 hours पुनः प्रविष्टि : २४ घंटे
Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
For Agriculture Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिए।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 654 C PANTONE 2012 C 'A' watermark 10% of base color

500 ml - 229 x 110 mm

229.00 mm

110.00 mm

ROTRIF SUPER

Thiamethoxam 30% FS Systemic Insecticide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Thiamethoxam a.i.: 30.00% w/w, Glycine: 5.10% w/w, Monoaz dye (Ingaolin Red C2B): 3.40% w/w, Copolymer of butanol-4:30% w/w, 1,2-Dimethylazolin-3-one: 0.20% w/w, Polyethylene glycol: 2.60% w/w, Water: QS % w/w, **Total: 100.00% w/w.** **Crops and Pest Group:** Recommended as seed treatment to control Jassids, Aphids and Whitefly in Cotton; Shoot fly in Sorghum and Maize; Termites in Wheat; Jassid in Okra; Thrips, GLM and Whorl Maggot in Rice; Jassid and Thrips in Sunflower; Stem fly in Soybean and Thrips in Chili Crop. **Direction of Use:** Read enclosed leaflet carefully before use. **Precautions:** Do not use cooking utensils for preparing slurry. Use stick for stirring the slurry solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask goggles and boots while mixing. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. **Antidote:** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **First Aid:** Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. In case of skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case of eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes. In case of ingestion: Repeatedly administer medical charcoal in a large quantity of water. **NOTE:** Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. **Symptoms:** Poisoning may cause symptoms of decrease in spontaneous movement, toxic convulsion and prosis. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area Refer the leaflet. 5. Do not spray during active bee-foraging period of the day. 6. Use with care to avoid air/dust contamination of the cropping area.

राष्ट्रीय सुपर थायामेथोक्सम ३०% एफएस अंतप्रवाही कीटनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: थायामेथोक्सम स.न.: ३०.००% भार/भार, ग्लिसिन: ५.१०% भार / भार, मोनोजो ड्राय (इंगालिन रेड सी 2B): ३.४०% भार/भार, प्रटोलेन का कोपॉलिमर: ४.३०% भार / भार, १,२-डिमिथिलोझोलीन-३-ओन: ०.२०% भार/भार, पॉलीथिलीन ग्लायकोल: २.६०% भार/भार, पानी: क्वांटिटी माता १% भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। **खतरा मुक्त समूह:** यह काया के फलस में होने वाले कीट जैसे तिलस, मादू और स्पेड समूहों; जवाब व मका की प्रमुख मक्खी; गेंदू के दीपक, मिट्टी के जंतु; धान के सुदूर, हरा पत्ती का चुटका व चट्टी प्रोट, सुदूरसूत्री के तारा व सुदूर, सोयाबीन के तारा मक्खी तथा विषों के सुदूर के जीव जंतुओं द्वारा निर्यात के लिए आयातित की जाती है। **उपयोग के लिए निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगक्षमता के लिए सावधानियां:** छिड़काव तैयार करने के लिए क्षारा पकाने से बचन का इस्तेमाल नहीं कीजिए। छिड़काव के पीछे की हिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। लव्या को छिड़काव स्थल से बचाव के लिए दस्ताने पहनें। सांस के साथ अन्न लेने और आंखों के संघर्ष से भी बचें। छिड़काव करते समय सावधान्यक काइडे जैसे मास्क, चूल्हा आदि पहनें। उन्नत की उठाने, रखने या प्रयोग करते समय छाया, पानी या धूपपान नहीं करना चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और डेर साँ पानी से धोएं। पहले हनु कराई को बदल लें और उन्हें अच्छी तरह से धोएं। **बिना सावधानी:** कोई विष प्रतिक्रिया नहीं। रसायनों के अलग-अलग बर्तों। **प्रायोगिक प्रतिक्रिया:** प्रयासित व्यक्ति को प्रतिक्रिया जगह से हटाकर बर्तों या कृषी सामान से दूर और परामर्श से बचाना। बिना काया के लवण छिड़काव से पराजित फलिका को सुरक्षा। परमा से लगे पर प्रतिक्रिया करवाते को उन्नत रें लवण सार के प्रयुक्ति विरामी को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। आँखों में चले जाने पर आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छुशकाए। निगाह जाने पर पानी में मैग्नेशियम कार्बोले को काफी मात्रा में घोलकर बचा कर दें। **मुद्रता:** कभी भी प्रतिक्रिया सार को ठीक से कुछ भी नहीं देना चाहिए। उन्नत करने की कोशिश न करें। **सुरक्षा:** विष के लवण से सतर्क में होकर, मिट्टी जैसे छत्रके और पोसिस हो सकते हैं। **समयनिर्धारण:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट पदार्थों के अलावा अन्य पदार्थों पर इस्तेमाल न करें। २. फलस की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. ३ वर्षों पर निर्दिष्ट अंतर के अलावा अंतरों के बाद फोटेन डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पानी/हाउस और सीमित क्षेत्रों के लिए आयातक विदेश और चतुर्क रचों दिखें। ५. जब संपूर्णकिया दिने की बात जानें अवधि में रकबा होत है, तो उसे नष्ट कर दें। ६. फलस को को वायु पृथ प्रदान से बचने के लिए सावधानी से प्रयोग करें।

राष्ट्रीय सुपर थायामेथोक्सम 30% एफएस अंतप्रवाही कीटनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: थायामेथोक्सम स.न.: 30.00% भार/भार, ग्लिसिन: 5.10% भार/भार, मोनोजो ड्राय (इंगालिन रेड सी 2B): 3.40% भार/भार, प्रटोलेन का कोपॉलिमर: 4.30% भार/भार, 1,2-डिमिथिलोझोलीन-3-ओन: 0.20% भार/भार, पॉलीथिलीन ग्लायकोल: 2.60% भार/भार, पानी: क्वांटिटी माता १% भार/भार, कुल: 100.00% भार/भार। **खतरा मुक्त समूह:** थायामेथोक्सम 30% एफएस अंतप्रवाही कीटनाशक है। यह काया के फलस में होने वाले कीट जैसे तिलस, मादू और स्पेड समूहों; जवाब व मका की प्रमुख मक्खी; गेंदू के दीपक, मिट्टी के जंतु; धान के सुदूर, हरा पत्ती का चुटका व चट्टी प्रोट, सुदूरसूत्री के तारा व सुदूर, सोयाबीन के तारा मक्खी तथा विषों के सुदूर के जीव जंतुओं द्वारा निर्यात के लिए आयातित की जाती है। **उपयोग के लिए निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगक्षमता के लिए सावधानियां:** छिड़काव तैयार करने के लिए क्षारा पकाने से बचन का इस्तेमाल नहीं कीजिए। छिड़काव के पीछे की हिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। लव्या को छिड़काव स्थल से बचाव के लिए दस्ताने पहनें। सांस के साथ अन्न लेने और आंखों के संघर्ष से भी बचें। छिड़काव करते समय सावधान्यक काइडे जैसे मास्क, चूल्हा आदि पहनें। उन्नत की उठाने, रखने या प्रयोग करते समय छाया, पानी या धूपपान नहीं करना चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और डेर साँ पानी से धोएं। पहले हनु कराई को बदल लें और उन्हें अच्छी तरह से धोएं। **बिना सावधानी:** कोई विष प्रतिक्रिया नहीं। रसायनों के अलग-अलग बर्तों। **प्रायोगिक प्रतिक्रिया:** प्रयासित व्यक्ति को प्रतिक्रिया जगह से हटाकर बर्तों या कृषी सामान से दूर और परामर्श से बचाना। बिना काया के लवण छिड़काव से पराजित फलिका को सुरक्षा। परमा से लगे पर प्रतिक्रिया करवाते को उन्नत रें लवण सार के प्रयुक्ति विरामी को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। आँखों में चले जाने पर आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छुशकाए। निगाह जाने पर पानी में मैग्नेशियम कार्बोले को काफी मात्रा में घोलकर बचा कर दें। **मुद्रता:** कभी भी प्रतिक्रिया सार को ठीक से कुछ भी नहीं देना चाहिए। उन्नत करने की कोशिश न करें। **सुरक्षा:** विष के लवण से सतर्क में होकर, मिट्टी जैसे छत्रके और पोसिस हो सकते हैं। **समयनिर्धारण:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट पदार्थों के अलावा अन्य पदार्थों पर इस्तेमाल न करें। २. फलस की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. ३ वर्षों पर निर्दिष्ट अंतर के अलावा अंतरों के बाद फोटेन डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पानी/हाउस और सीमित क्षेत्रों के लिए आयातक विदेश और चतुर्क रचों दिखें। ५. जब संपूर्णकिया दिने की बात जानें अवधि में रकबा होत है, तो उसे नष्ट कर दें। ६. फलस को को वायु पृथ प्रदान से बचने के लिए सावधानी से प्रयोग करें।

राष्ट्रीय सुपर **राष्ट्रीय सुपर**

ROTRIF SUPER
Thiamethoxam 30% FS
राष्ट्रीय सुपर
थायामेथोक्सम ३०% एफएस

Keep out of the reach of children.
बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
खतरा DANGER (मय)
आपको भी खतरा हो सकता है।

INSECTICIDE
कीटनाशक

Net Content **500 ml**
शुद्ध मात्रा **५०० मि.ली.**

ALBAUGH
your alternative

Regn. No.: CIR-230111/2022-Thiamethoxam (FS) (442)-1041
पंजी नं./रजि. नं.: सीआईआर-२३०१११/२०२२-थायामेथोक्सम (एफएस) (४४२)-१०४१
Mfg. Lic. No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: /G.८11.नं. एमएल/जैडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By:
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagari Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400098.
निर्माता और विपणनकर्ता: **रोटम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,** १७५, कगलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांतक्रुज (पू), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Tal.: Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी: जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।
For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughlic.com

Batch No.:
बैच नं.:
श्रेणी नं.:
Mfg. Date:
उत्पादन तिथि:
दस्तावेज तारीख:
Exp. Date:
समय तिथि:
अवधि समाप्त होने की तिथि:
Maximum retail price
निर्वाहक की कीमत
in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य
राष्ट्रीय मुद्रा में : ₹
अवधि समाप्त होने की तिथि:
उत्पादन तिथि:
दस्तावेज तारीख:
Net Content: 500 ml **शुद्ध मात्रा: ५०० मि.ली.**
Registered Trademark

Re-entry: 24 hours **पुनः प्रविष्टि: २४ घंटे**
Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
For Agriculture Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिए।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 654 C **PANTONE 2012 C** **'A' watermark 10% of base color**

250 ml - 206 x 77

← 206.00 mm →

↑ 77.00 mm ↓

ROTRIF SUPER Thiamethoxam 30% FS Systemic Insecticide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Thiamethoxam a.i.: 30.00% w/w, Glycerine: 5.10% w/w, Monazo dye (Irgalith Red C2B): 3.40% w/w, Copolymer of butanol: 4.30% w/w, 1,2-Benzisothiazolin-3-one: 0.20% w/w, Polyethylene glycol: 2.60% w/w, Water: QS % w/w. **Total: 100.00% w/w.**

Crops and Pest Group: Recommended as seed treatment to control Jassids, Aphids and Whitefly in Cotton; Shoot fly in Sorghum and Maize; Termites in Wheat, Jassid in Okra, Thrips, GLH and Whorl Maggot in Rice; Jassid and Thrips in Sunflower; Stem fly in Soybean and Thrips in Chilli Crop. **Direction of Use:** Read enclosed leaflet carefully before use. **Precautions:** Do not use cooking utensils for preparing slurry. Use stick for stirring the slurry solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask goggles and boots while mixing. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. **Antidote:** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **First Aid:** Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. In case of skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case of eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes. In case of ingestion: Repeatedly administer medical charcoal in a large quantity of water. **NOTE:** Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. **Symptoms:** Poisoning may cause symptoms of decrease in spontaneous movement, toxic convulsion and ptosis. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area Refer the leaflet. 5. Do not spray during active bee-foraging period of the day. 6. Use with care to avoid air/dust contamination of the cropping area.

राष्ट्रीय सुपर **రోట్రీఫ్ సుపర్**

ROTRIF SUPER
Thiamethoxam 30% FS
राष्ट्रीय सुपर
थायामेथोक्साम ३०% एफएस

Regn. No.: CIR-230111/2022-Thiamethoxam (FS) (442)-1041
पंजी नं./रजि. नं. सीआईआर-२३०१११/२०२२-थायामेथोक्साम (एफएस) (४४२)-१०४१
Mfg. Lic. No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं./G.च.नं. एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By:
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalkwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400068.
निर्माण और विपणनकर्ता: मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,
१७५, कागलकवाला हाउस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सान्ताक्रुज (पू), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००६८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Tal.: Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी: जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाद-फतेहनगर, रोहिल-मवलली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 18003000335, Email: contactin@albaughlic.com

खतरा DANGER (भय)

INSECTICIDE कीटनाशक

Net Content 250 ml शुद्ध मात्रा २५० मि.ली.

ALBAUGH your alternative

उपयोग से पहले संस्था नोटिफिकेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: थायामेथोक्साम स.ज.: ३०.००% भार/भार, सिलिसिन: ५.१०% भार / भार, मोनाजो डाय (इरगलिय रेड सी २बी): ३.४०% भार/भार, ब्यूटनोल का कोपोलिमर: ४.३०% भार / भार, १,२-बेन्जोसिथाज़ोलीन-३-ओ: ०.२०% भार/भार, पॉलीथिलीन ग्लायकोल: २.६०% भार/भार, पानी: क्वॉर: १००.००% भार/भार। **फसलें एवं कीट समूह:** गहू फसल के फलन में होने वाले कीट जैसे गेरुआ, भांगू और समुद्र सख्खी; जवाब व चावल की जड़ों सख्खी, मूंगू के टीका, मिठी के गेरुआ, धान के चूरा, धान पत्ती का चूराएक व कृमि मोगट, चूराचूरा के लेला व चूराट, सोयाबीन के लता सख्खी तथा मिर्च के चूरा के लेला जवाब ट्टर। सिन्धु के लिए सिन्धुवादी की जाती है। **उपयोग के लिए निर्देश:** उपयोग से पहले संस्था नोटिफिकेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** छिड़काव तैयार करने के लिए खाना चकाने के बर्तन का इस्तेमाल नहीं कीजिए। छिड़काव के पीछे की छिटाव के लिए लकड़ी का उपयोग करें। लकव को छिड़काव स्थान से बचाने के लिए दस्ताने पहनें। सांस के साथ अट्टर होने और आंखों के संपर्क से भी बचें। छिड़काव करते समय सुरक्षात्मक कपड़े जैसे मास्क, चूना, चूना और पतले। उपचार को उड़ाने, खाने या उपयोग करने समर्थ ब्राना, पीना या प्यूपन नहीं करना चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद आंखों को धुएँ और धो लो नहीं धोएँ। पानी ठूठ करवाओ को बरत लो और उन्हे अचको को धो लो। **पिन मार्क:** कोई छिपा प्रतीक नहीं। सफाई के अंशमा उपचार करें। **सावधान्य चिह्निका:** प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हटाकर कम से कम १० मीटर दूर ले जाए और तालाम से बचाए। विष शेष के सहाय दिखाई देते पर तुरंत चिकित्सक को सूचनाएं। लकवो में लसने पर प्रदूषित कपड़ों को जगह से हटाए और तालाक। प्रभावित वस्तुओं को साफ और पानी से अच्छी तरह धोएं। आंखों में चले जाने पर आंखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह धुआइए। निम्न जगह पर पानी में मैग्निफिल चारकोल को काफी मात्रा में घोलकर बाए बाए दें। सूचना: कभी भी मुक्ति मात्र को मूत्र से कुछ भी नहीं देना चाहिए। जट्टी करने की सीमा न करें। लकवो: विष के लसने से लसने में हीनालस, मिर्च जैसे इन्फे और टोमिडो हो सकते हैं। **सुरक्षाचिह्निका:** १. इस चिह्न / लीफलेट पर प्रिंटिंग फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैकजिंग के बाद इस का उपयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर प्रिंटिंग प्रलेख के अंशमा प्रयोग के बाद बॉटल डिब्बे को उल्टा कर दें। ४. पॉलीथीलेन और सीलिंग धोने के लिए आवश्यक दिशान और सुरक्षा पत्तों दें। ५. जब संपूर्णकियां दिन की चारा खोज अंत में सफाई होती है, तो उसे मत करो। ६. फसल क्षेत्र की वायु प्रदूषण से बचने के लिए सावधानी से प्रयोग करें।

PANTONE 654 C PANTONE 2012 C 'A' watermark 10% of base color

Shipper Label 180 mm X 110 mm

CMYK

180.00 mm

110.00 mm

राष्ट्रीय सुपर रॉट्रिफ सुपर

ROTRIF® SUPER
Thiamethoxam 30% FS
राष्ट्रीय सुपर
थायामेथोक्साम ३०% एफएस

खतरा
DANGER
ભય

Keep out of the reach of children.
बच्चों को पहुँच से दूर रखिये।
બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

INSECTICIDE
कीटनाशक

ALBAUGH®
your alternative

PACKING

Regn. No.: CIR-230111/2022-Thiamethoxam (FS) (442)-1041
पंजी नं./रजि. नं.: सीआईआर-२३०१११/२०२२-थायामेथोक्साम (एफएस) (४४२)-१०४१
Mfg. Lic. No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं./G.O.A.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्मता और विपणनकर्ता : मे. रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज (पू), होंडा शोरूम के पीछे,
मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address,
Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. / बैच नं. / बेच नं. :
Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
উৎপাদন তারিখ:
Exp. Date / समापन तिथि :
अप्यथी समाप्तिनी तारीख:
Maximum retail price ₹ :
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य र :
सभी करों सहित
यधुभां यधु रीटेल डिभंत र :
इरपेरा साथे

© - Registered Trademark Re-entry: 24 hours पुनः प्रविष्टि: २४ घंटे
Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें। Imitation of label graphics is a punishable offence.
For Agriculture Use Only.
केवल कृषि उपयोग के लिए!

THIS SIDE UP

