TOLEDO S

Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG
(Systemic and Contact Fungicide)

Chemical Composition: Tebuconazole a.i. 10.00% w/w, Sulphur a.i. 65.00% w/w, Potassium polycarboxylate 2.50% w/w, Phenolsulfonic acid phenol formaldehyde urea condensate, Na salt 5.00% w/w, Carboxy methyl cellulose 1.15% w/w, Sodium lignosulfonate 5.50% w/w, Polydimethyl siloxane 0.10% w/w, China clay Q.S.%, **Total : 100.000% w/w. Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foofstuffs empty foodstuff containers and animal food. 2. The user should use appropriate protective clothing like hat, long shirt, long pant and shoes. 3. Avoid contact with eyes and skin while handling the product. 4. Avoid inhalation. 5. Do not drink, eat or smoke during application. 6. Remove contaminated clothes and wash before re-use. 7. Do not re-use empty containers. 8. Wash thoroughly the contaminated clothes & parts of the body with soap and water after work. **Antidote:** No specific antidote. Treat symptomatically. **First Aid:** Please read enclosed leaflet before use. **Symptoms:** Headache, dizziness, weakness, nausea, sore throat, chest pain, lightheadedness, sneezing, coughing and may cause irritation of skin mucous membranes. **Recommendations:** Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG (water dispersible granule) is a effective fungicide with protective, creative and eradicative action. It controls powdery mildew of mango, fruit rot, powdery mildew of chilli and leaf spot, pod blight disease of soybean. **Warning:** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area -Refer the leaflet.

टोलेडो एस

टेबुकोनाजोल १०% + सल्फर ६५% डब्ल्यू. जी.
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

रासायनिक संरचना: टेबुकोनाजोल स.त. १०.००% भा/भा, सल्फर स.त. ६५.००% भा/भा, पोटेशियम पोलिकार्बोक्सिलेट २.५०% भा/भा, फेनालसल्फोनिक एसिड फेनाल फॉर्मलडीहाईड यूरिया कंडेनसेट एनए साल्ट ५.००% भा/ भा, कार्बोक्सी मिथाईल सेलूलोस १.१५% भा / भा, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट ५.५०% भा / भा, पोलीडायमिथिलीन सिलोक्सेन ०.१०% भा/भा, चायना रेत पर्याप्त मात्रा %, **योग : १००.०००% भा/ भा । उपयोग के लिये निर्देश:** इस्तेमाल से पहले साथ में दिया हुआ पर्चा पढ़ लें । **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** १. खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. इसका इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी टोपी, लम्बी पैंट, शर्ट और जूते पहने। ३. प्रयोग करते समय त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचें। ४. इसको सुघें नहीं। ५. उपयोग के समय खान-पान और धुम्रपान मना है। ६. सम्पर्क में आये हुए कपड़ों को निकाल कर साबुन और पानी से धो लें। ७. खाली डिब्बे को दोबारा इस्तेमाल न करें। ८. उपयोग के काम के बाद हाथों और चर्म को साबुन और पानी से धो लें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षण के अनुसार डॉक्टरी उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** इस्तेमाल से पहले साथ में दिया हुआ पर्चा पढ़ लें । **लक्षण:** सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, मितली, गले में खराश, सीने में दर्द, छींकना और खांसना तथा त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली में जलन पैदा कर सकते हैं। **उपयोग :** टेबुकोनाजोल १०% + सल्फर ६५% डब्ल्यू. जी. (पानी में घुलने वाले दानें) एक असरदार रोगरक्षक, रोगनिवारक एवं रोगनाशक फफूंदीनाशक है । यह आम का चूर्णी फफूंदी, मिर्च के फल सड़न, चूर्णी फफूंदी तथा सोयाबीन का पूर्ण धब्बा एवं फली के झुलसा को नियंत्रित करता है। **चेतावनी:** १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें. २) फ़सल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल ना करें. ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट करें. ४) पॉली हाउसेस और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए-पत्रक देखें.

ટોલેડો એસ

ટેબુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુ. જી.
(આંતરપ્રવાહી અને સ્પર્શીય ફૂગનાશક)

રાસાયણિક સંયોજન: ટેબુકોનાઝોલ સ.ત. 10.00% ભાર/ભાર, સલ્ફર સ.ત. 65.00% ભાર/ભાર, પોટેશિયમ પોલીકાર્બોક્સિલેટ 2.50% ભાર/ભાર, કેનોલસલ્ફોનિક એસિડ કેનોલ ફોર્મલડિહાઇડ યુરિયા કન્ડેન્સેટ એન.એ. સોલ્ટ 5.00% ભાર/ભાર, કાર્બોક્સિ મિથાઇલ સેલ્યુલોઝ 1.15% ભાર/ભાર, સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ 5.50% ભાર/ભાર, પોલીડાયમિથાઇલ સિલોક્સેન 0.10% ભાર/ભાર, ચીનાઇ માટી પુરતી માત્રા %, **કુલ: 100.000% ભાર/ભાર. ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:** ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફ્લેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. **ઉપયોગકર્તાઓ માટે સાવચેતીઓ:** 1. આ દવાને ખાણીપીણીની વસ્તુઓ, ખાણીપીણીની વસ્તુઓના ડબ્બાઓ તેમજ પશુ આહારથી દૂર રાખો. 2. આ દવાના ઉપયોગકર્તાએ છંટકાવ સમયે શરીર પર હેટ, લાંબો શર્ટ, લાંબો પેંટ અને બૂટ વગેરે યોગ્ય સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવાં જોઇએ. 3. આ દવાને ચામડી અને આંખો સાથે સંપર્કથી બચાવો. 4. આ દવાને સૂંઘશો નહીં. 5. આ દવાના છંટકાવ સમયે કશું પણ ખાવાપીવાની, ધૂમ્રપાન કરવાની અને તમાકુ ચાવવાની મનાઇ છે. 6. આ દવાના સંપર્કમાં આવેલ કપડાંને કાઢીને સાબુ અને ખૂબ પાણીથી ધોઇ નાખો. 7. ખાલી ડબ્બાઓનો ફરી વાર ઉપયોગ ન કરો. 8. આ દવાના ઉપયોગ પછી ચામડી અને આંખોને સાબુ અને ખૂબ પાણીથી ધોઇ નાખો. **વિષનાશક:** કોઇ વિષનાશક જણાતું નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો. **પ્રાથમિક સારવાર:** ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફ્લેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ઝેરમાં લક્ષણો: માથાંમાં દુખાવો, ચક્કર આવવા, શરીરમાં નબળાઈ, ઉબકા, ગળામાં બરાશ, છાતીમાં દુખાવો, છીંક અને ઉધરસ આવવી, ચામડીમાં બળતરા, નાક વહેવું વગેરે. **ભલામણ:** ટેબુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુ જી (પાણીમાં ઓગળી જાય તેવા દાણા) એક અસરદાર રક્ષાત્મક, રોગનિવારક અને રોગનાશક ફૂગનાશક છે. તે કેરીનો ભૂકી છારો, મરચાંમાં ફળના સડાના રોગ, ભૂકી છારો, સોયાબીનમાં પાન ડાઘ, ફળી અંગમારીના રોગને કાબૂમાં લે છે. **સાવચેતીનું નિવેદન:** 1. લેબલ અને પત્રકો પર ઉલ્લેખિત સિવાયના પાક અને જંતુઓ પર ઉપયોગ નહીં કરો. 2. લણણી પશ્ચાત છંટકાવ માટે ઉપયોગ નહીં કરવો જોઇએ. 3. ઉપયોગ પછી ડબ્બા પત્રકમાં નિર્દેશ અનુસાર નાશ કરો, 4. પોલી હાઉસીસ અને બંધિયાર જગ્યા માટે નિર્દેશ અને માત્રા- પત્રક જુઓ.

टोलेडो एस | **ટોલેડો એસ**

TOLEDO® S

Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG

टोलेडो एस

टेबुकोनाज़ोल १०% + सल्फर ६५% डब्ल्यू जी

FUNGICIDE
फफूंदीनाशक

Net Content 1 kg
शुध्द मात्रा १ कि ग्रा

ALBAUGH®
your alternative

Read enclosed the leaflet before use.
उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े।
ઉપયોગ કરતા પહેલા જોડાયેલ પત્રિકા વાંચો.

Regn. No. : CIR-229996/2022-Tebuconazole + Sulphur (WG) (442)-641
रजि. नं.: सीआईआर-२२९९९६/२०२२-टेबुकोनाज़ोल + सल्फर (डब्ल्यू.जी.) (४४२)-६४१
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / ઉ.લા.ન. : एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address,Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Re-entry: 24 hours **पुनःप्रविष्टी :** २४ घंटे

® - Registered Trademark

Keep in cool, dry place away from heat and open flame
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

For Agricultural Use
कृषि उपयोग के लिए

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:

Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹:
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹ :
વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં ₹:
Unit sale price : ₹

Net Content : 1 kg **शुध्द मात्रा : १ कि.ग्रा.**

PANTONE 193 C PANTONE 5473 C 'A' watermark 10% of base colour

টলেডো এছ

টেবুক'নাজল 10% + ছালফাৰ 65% W.G.
(অম্লধ্ৰাহী আৰু স্পৰ্শীয় ছেঁকুৰনাশক)

টেবুক'নাজল 10% + ছালফাৰ 65% WG (ৰাটত ডিছপাৰ্ছিবল গ্ৰেনিউল) হৈছে সুৰক্ষাত্মক, সুজনীশীল আৰু নিৰ্মূলকৰণ কাৰ্যৰ সিতে এবিধ প্ৰভাৱশালী ছেঁকুৰনাশক। ই জলকীয়া পাউডাৰী মিলডিউ, ফ্ৰুট ৰট ৰোগ; ছয়াবিনৰ লীফ স্পট, প'ড ব্লাইট ৰোগ, আমৰ পাউডাৰী মিলডিউ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে।

অনুমোদন সমূহ:

শস্য	ৰোগৰ সাধাৰণ নাম	ডঁজ/হেক্টেৰ এ.আই. (গ্ৰাম/হেক্টেৰ)	ফৰ্মুলেশন (গ্ৰাম/হেক্টেৰ)	পানীত ছৰণ (লিটাৰ)	শেষবাৰ ছটিওৱাৰ পৰা দোৱাৰিলৈকে অপেক্ষাৰ সময় (দিন)
জলকীয়া	পাউডাৰী মিলডিউ, ফল পচা ৰোগ	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	5
আম	পাউডাৰী মিলডিউ	0.15 + 0.975	1.5	1000	97
ছয়াবিন	লীফ স্পট, প'ড ব্লাইট	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	26

প্ৰয়োগৰ বাবে নিৰ্দেশ: সামগ্ৰীবিধৰ প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণ জুখি লৈ কম পৰিমাণৰ পানীত মিহলাওক। বাকী থকা পানী ভালদৰে লবাই উপযুক্ত স্প্ৰেয়াৰলৈ এটাৰে শস্যমিতি প্ৰয়োগ কৰক। পিপি সঁজুলি- নেপছেক স্প্ৰেয়াৰ, ফুট স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেশান নেপছেক স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেশান নেপছেক বেটেৰী স্প্ৰেয়াৰ, বেটেৰীচালিত পাৱাৰ স্প্ৰেয়াৰ আৰু ASPEE-HTP পাৱাৰ স্প্ৰেয়াৰ।

প্ৰয়োগৰ সময়: ৰোগ দেখা দিয়াৰ সময়ত।

ব্যৱহাৰকৰ্তাৰ বাবে সতৰ্কতা:

1. খাদ্য সামগ্ৰী, খোৱাৰ খালী পাত্ৰ আৰু পশুৰ দানাৰ পৰা আঁতৰত ৰ'ব।
2. প্ৰয়োগকৰ্তাই সঠিক পোছক, যেনে টুপী, দীঘল লেগ-চোলা আৰু জোতা পিন্ধা উচিত।
3. সামগ্ৰীটো প্ৰয়োগ কৰোঁতে ছাল আৰু চকুৰ স্পৰ্শ হ'বলৈ নিদিব।
4. উশাহতে নল'ব।
5. প্ৰয়োগৰ সময়ত একো নাখাব, পান নকৰিব বা ধূমপানো নকৰিব।
6. পুনৰ ব্যৱহাৰৰ আগতে ব্যৱহাৰ কৰা দূষিত কাপোৰ খুলি ভালদৰে ধুই ল'ব।
7. খালী পাত্ৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব।
8. দূষিত কাপোৰ আৰু শৰীৰৰ অংশ কামৰ পাছত চাবোন আৰু পানীৰে ভালদৰে ধুই পেলাব।

বিষৰ লক্ষণ:

মূৰৰ বিষ, মূৰ ঘূৰোৱা, টোপনি অহা, দুৰ্বলতা, ওকউ পাকউ লগা, হাঁচি মৰা, কাহ অহা, ছালত জ্বলন হোৱা, ডিঙি জ্বলা-পোৱা কৰা ইত্যাদি।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা:

যদি চকুত তোমায়, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী দি ধুই পেলাব। দূষিত কাপোৰ আৰু শৰীৰৰ প্ৰভাৱিত অংশসমূহ চাবোন আৰু পানীৰে ধুই পেলাব। যদি বশ্যনবিধ উশাহত ভিতৰলৈ লোৱা হয়, তেন্তে প্ৰভাৱিত ব্যক্তিজনক সতেজ বায়ু পোৱা স্থানলৈ নিব লাগে। উশাহ লোৱাত অসুবিধা পালে কৃত্ৰিম উশাহ দিব। অচেতন ব্যক্তিৰ মুখত একো খাবলৈ বা পিবলৈ নিদিব। যদি ব্যক্তিজন অচেতন হৈ থকা নাই, তেওঁৰ মুখখন পানীৰে ধুই পেলাব। জ্ঞানেৰে থকা ব্যক্তিজনে এগৰাকী ডাক্তৰক যোগাযোগ কৰক।

ফায়টোটক্সিচিটি:

প্ৰস্তাৱিত মাত্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰলে কোন বিষক্ৰিয়তা হয় না।

বিষ প্ৰতিষেধক:

লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা কৰাওক। কোনো নিৰ্দিষ্ট বিষ প্ৰতিষেধক নাই।

ব্যৱহৃত পাত্ৰৰ ক্ৰিয়াখ:

1. পৰিবেশ আৰু জল প্ৰদূষণ নহ'বৰ বাবে হাৰ্বিচাইডৰ নিৰ্মাতা, ফৰ্মুলেটৰ আৰু অপাৰেটৰৰ দায়িত্ব যে পেকেজসমূহ বা অতিৰিক্ত সামগ্ৰীবিলাক তেওঁলোকে নিবাপদভাৱে নিষ্পত্তি কৰে।
2. ব্যৱহৃত বাচনখিনি/ পেকেজ বাহিৰত নাবাখিব, যাতে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়।
3. পাত্ৰটো ভাঙি পেলাই বসতিৰ পৰা আঁতৰত পুতি পেলাব।

সংৰক্ষণৰ পৰিস্থিতি:

1. ছেঁকুৰনাশক কণা পেকেটবোৰ অন্য সামগ্ৰী বিশেষকৈ খাদ্যবস্তু থোৱা কোঠালি বা চৌহদৰ পৰা আঁতৰত সুকীয়া কোঠালি বা চৌহদত জমা কৰি থোৱা উচিত বা ছেঁকুৰনাশক পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সুকীয়া আলমাৰিত তলা মাৰি থোৱা উচিত।
2. ছেঁকুৰনাশক সংগ্ৰহ কৰি থোৱা কোঠালি ভালকৈ পোহৰ পৰা, শুকান, ভালকৈ নিৰ্মিত, বতাহ চলাচল কৰিব পৰাকৈ আৰু যথেষ্ট আহল-বহল হোৱা উচিত।

ৰাসায়নিক সংৰচনা:

পলিডাইমিথাইল ছাইল' জেন	0.10% w/w
টেবুক'নাজল এ.আই.	10.00% w/w
ছালফাৰ এ.আই.	65.00% w/w
পটেছিয়াম পলিকাৰ্বক্সিলেট	2.50% w/w
ফেনলছালফনিক এচিড ফেনল ফৰ্মেলডিহাইড ইউৰিয়া	5.00% w/w
ইউৰিয়া কনডেন্সেট, Na ছল্ট	
কাৰ্বক্সি মিথাইল ছেলুলজ	1.15% w/w
ছডিয়াম লিগন' ছালফনেট	5.50% w/w
চাইনা ক্লে	QS %
মোট:	**100.00% w/w**

সতৰ্কতাবাণী: 1. লেবেল বা লীফলেটত উল্লেখ নথকা শস্যত প্ৰয়োগ নকৰিব। 2. শস্য ছপোৱাৰ পাছৰ প্ৰয়োগ হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰিব। 3. লীফলেটত দিয়া অনুসৰি প্ৰয়োগৰ পাছত পাত্ৰটো নষ্ট কৰি পেলাব। 4. পলি-হাউছ আৰু আবদ্ধ অঞ্চলৰ নিৰ্দেশ আৰু ডঁজৰ বাবে- লীফলেটখন চাওক।

टोलेडो-एस

टेबुकोनाझोल 10% + सल्फर 65% डब्लू.जी.
(अंतर्प्रवाही आणि स्पर्शीय बुरशीनाशक)

टेबुकोनाझोल 10% + सल्फर 65% डब्लू.जी. (पाण्यात विरघळणारे दाणे) एक प्रभावी संरक्षक, रोगनिवारक आणि रोगनाशक बुरशीनाशक आहे. मिर्चीवरील पावडरी मिल्ड्यू, फळ कूज रोग, सोयाबीनवरील पानांवरील डाग, शेंगावरील करपा रोग, आंब्यावरील पावडरी मिल्ड्यू यांचे नियंत्रण करते.

वापराच्या पद्धति:

पीक	रोगाचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा स.तत्त्व (ग्रॅ./ हेक्टर)	संरचना (ग्रॅ./ हेक्टर)	पाण्याचे प्रमाण (ली.)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या कालात अंतर (दिवसात)
मिरची	पावडरी मिल्ड्यू आणि फ्रूट रॉट	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	5
आंबा	पावडरी मिल्ड्यू	0.15+ 0.975	1.5	1000	97
सोयाबीन	लीफ स्पॉट आणि पॉड ब्लाईट	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	26

वापरण्यासाठी निर्देश: उत्पादन आवश्यक प्रमाणात मोजून घ्या आणि थोडया पाण्यात चांगले मिसळा. उर्वरित पाणी निर्देशानुसार मिसळा आणि सुयोग्य स्प्रेयरद्वारे संपूर्ण पिकाच्या आच्छादनासाठी ढवळत राहून मिसळा. वापरात येणारी उपकरणे: नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बॅटरी स्प्रेयर, बॅटरीने चालणारे पॉवर स्प्रेयर आणि एएसपीइइ–एचटीपी पॉवर स्प्रेयर.

वापरण्याची वेळ: रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यानंतर.

दक्षता:

1. खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थाचे रिकामे डबे आणि पशुखाद्यापासून लांब ठेवा.
2. वापरणाऱ्याने हेट, लांब बाह्यांचा शर्ट, लांब पॅंट आणि बूट यासारखे योग्य संरक्षक कपडे घालावे.
3. उत्पादन हाताळताना डोळे आणि त्वचेशी संपर्क होऊ देऊ नका.
4. श्वासावाटे आत जाऊ देऊ नका.
5. फवारणी करताना खाऊपिऊ नका आणि धूम्रपान करू नका.
6. दूषित कपडे काढून टाका आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी ते धुवा.
7. रिकामे डबे पुन्हा वापरू नका.
8. काम झाल्यावर दूषित कपडे आणि शरीराचे दूषित भाग साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा.

विषबाधेची लक्षणे: डोकेदुखी, गरगरणे, थकवा, मळमळ, घसा खवखवणे, छातीत दुखणे, शिंका, खोकला आणि रिकन म्युकस मेम्ब्रेन मध्ये जळजळ अशी लक्षणे दिसू शकतात.

प्रथमोपचार: डोळ्यात गेले असल्यास भरपूर पाण्याने धुवा. दूषित कपडे काढून टाका आणि शरीराचे दूषित भाग भरपूर पाणी आणि साबणाने धुवा. रसायन श्वासावाटे आत गेले असल्यास रुग्णाला मोकळ्या हवेत न्या. श्वास घ्यायला त्रास होत असल्यास कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या. वेशुद्ध असलेल्या रुग्णास तोंडावाटे काहीच देऊ नका. रुग्ण शुद्धीत असल्यास चूळ भरायला सांगा. उल्टी करवू नका. 1–2 ग्लास पाणी प्यायला द्या. त्वरित डॉक्टरांना बोलवा.

झाडांना विषबाधा: निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.

विषनाशक: कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

डबे खोक्यांची विल्हेवाट:

1. पॅकेजिस किंवा जादा उरलेले द्रावण तसेच साधनसाहित्य आणि डबे यांची विल्हेवाट सुरक्षित प्रकारे आणि पर्यावरण किंवा पाणी प्रदूषित होणार नाही याची काळजी घेऊन करावी.
2. रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत.
3. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून उघड्यावर ठेवू नयेत.

सांठवण:

1. बुरशीनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ सातवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत सातवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुलपात ठेवावीत.
2. बुरशीनाशकच्या सातवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचना:

पॉलिडीमिथाईल सिलोक्सेन	0.10% भार / भार
टेबुकोनाझोल स.त.	10.00% भार / भार
सल्फर स.त.	65.00% भार / भार
पोटेशियम कार्बोक्सिलेट	2.50% भार / भार
फेनोलसल्फोनिक एसिड फेनोल फॉर्मेल्डीहाइड युरिया	5.00% भार / भार
कंडेन्सेट एन ए सॉल्ट	
कार्बोक्सी मिथाईल सेल्युलोज	1.15% भार / भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	5.50% भार / भार
चायना क्ले	पुरेसे प्रमाण %
एकूण:	**100.00% भार / भार**

इशारा: 1. लेबल आणि निर्देश पत्रिकेत उल्लेख असलेल्या कीटक आणि पिकांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कीटक आणि पिकासाठी याचा वापर करू नये. 2. कापणी नंतर वापरू नये. 3. वापरल्यानंतर रिकामे डबे निर्देश पत्रिकेत सांगितल्याप्रमाणे नष्ट करावे. 4. पॉलि हाऊसेस आणि निर्धारित क्षेत्रासाठी निर्देश आणि प्रमाण–निर्देश पत्रिका बघा.

টোলেডো–এস

টেবুকোনাজোল 10% + সল্ফৰ 65% ডব্লিউ.জী.
(আন্তঃপ্ৰবাহী আৰু স্পৰ্শীয় ফুঙনাশক)

টেবুকোনাজোল 10% + সল্ফৰ 65% ডব্লিউ জী (পাছুলীমাঁ ওলগুলি জাম তেবা ছাছা) এক অসৰহৰ ৰক্ষাত্মক, ৰোগনিবাৰক আৰু ৰোগনাশক ফুঙনাশক ছ. তে মৰ্চাংনা পাকমাং পাৱডৰী মিল্ডিয়ু অনে ফ্ৰুট ৰোট; সোয়াবীননা পাকমাং থনা লীফ স্পোট অনে পোড ব্লাইটে মেমজু কৈনা পাকমাং থনা পাৱডৰী মিল্ডিয়ুনা ৰোগো পৰ অংকুয় ৰাখে ছ.

বপ্ৰয়োগ:

পাক	ৰোগনা সামান্য নামো	প্ৰতি ছেক্টৰ মাত্ৰা স.ত. (গ্ৰাম/ হেক্টৰ)	সংৰচনা (গ্ৰাম/ হেক্টৰ)	পাছীনী মাত্ৰা (লীটৰ)	ছেঁৱৰ্ত্তা ছেঁৱৰ্ত্তা তথা পাক কাপৰা বগ্যেৰনা অংতৰল (দিৱস)
মিৰচ	পাৱডৰী মিল্ডিয়ু অনে ফ্ৰুট ৰোট	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	5
কেৰী	পাৱডৰী মিল্ডিয়ু	0.15 + 0.975	1.5	1000	97
সোয়াবীন	লীফ স্পোট অনে পোড ব্লাইটে	937.50+ (125 + 812.5)	1250	500	26

উপযোগ মাটেনা নিৰ্দেশ: উৎপাদননী জৰুৰী মাত্ৰা মুজুম মাপ লই লো অনে আঁচোঁ পাণীমাং বৰাবৰ ভেগৰো। জৰুৰ মুজুম ভাৱিনুং পাণী উমৰো অনে হলায়ো। পছী তেনে যোগ্য স্প্ৰেয়ৰ (ছেঁকায় যন্ত্ৰ) বৰে পাকমাং অৰাবৰ ছেঁকায় কৰো. ছাং সুৰক্ষ উপকৰণ: নেপ্সেক স্প্ৰেয়ৰ ফুট স্প্ৰেয়ৰ, কাম্প্ৰেশান নেপ্সেক স্প্ৰেয়ৰ, কাম্প্ৰেশান নেপসেক বেটৰী স্প্ৰেয়ৰ, বেটৰী আপৰেটেড পাৱৰ স্প্ৰেয়ৰ তেমজু অসখী-এচটীপী পাৱৰ স্প্ৰেয়ৰ.

উপযোগনা সময়: ৰোগনং লক্ষণো দেখাবা লাগে ত্যৰে.

উপযোগকৰ্তাঅনা মাটে সাবধেনীঅনো:

1. আ দবানং খাদ্যীপীপীনী বস্তুঅনা, খাদ্যীপীপীনী বস্তুঅনা ডব্বাঅনা তেমজু পশু আহাৰহী দূৰে ৰাখো.
2. আ দবানা উপযোগকৰ্তাঅনে ছেঁকায় সময়ে শৰীৰ পৰ হেট, লাংবা শৰ্ট, লাংবা পেঁট অনে বুট বগৈৰে যোগ্য সুৰক্ষাত্মক ক্ষপৰাং পহেৰবাং জাঁওঅ.
3. আ দবানং চামৰী অনে আংখা মাঁয়ে সংপৰ্কী বচাবো.
4. আ দবানং ঝুঁয়ৰো নহীঁ.
5. আ দবানা ছেঁকায় সময়ে কচুং পণ্ড খাবাপীবানী, ধূম্ৰপান কৰবানী অনে তমাকু যাববানী মনাঁচ্ছ.
6. আ দবানা সংপৰ্কমাং আবেল কপৰাংনা ক্ষাৰীনে সাবু অনে খুপ পাণীহী ধোঁই নাখো.
7. খালী ডব্বাঅনোনা ফৰী বাৰ উপযোগ ন কৰো.
8. আ দবানা উপযোগ পছী যামৰী অনে আংখানে সাবু অনে খুপ পাণীহী ধোঁই নাখো.

ঝেৰনা লক্ষণো: মাথামাং ঝুখাবো, চক্কৰ আববা, শৰীৰমাং নাৰভাৰ্ই, ঔকৰা, অণামাং খৰাৰা, ছাতীমাং ঝুখাবো, ছীঁক অনে উথৰেক আববী, যামৰীমাং ঝণাতৰা, নাক বহেবুং বগৈৰে.

প্ৰাথমিক চিকিৎসা: জৌ আ দবানং নাকমা মঁয়েৰব ঠেৰ 'তে যথুৰ সাৰে পাণী নাক ধৌ লওঁ। জৌ ঁৰ্ত্তীলোসাৰ চমৰী 'তে লেঁগা ৰিগা হৈছে তাঁ ফুঙ্গাৰিব কপৰৈ লাগ দিওঁ অনে চমৰী ঁৰ্ত্তৰুবুং পাণী অনে সাবুৰ নাকত ধৌ দিওঁ। জৌ সাগ নাকল মৰীৰ অংৰৰ ৰলা ৰিগা হৈছে তাঁ ৰেগী ঁৰ্ত্তৰুবুং পাণী অনে সাবুৰ নাকত ধৌ দিওঁ। জৌ সাগ

ടോളിഡോ എസ്

ടെബുകൊനാസോൾ 10% + സൾഫർ 65% ഡബ്ലിയുജി
(അന്തർവ്യാപനസമ്പർക്ക കുമിൾനാശിനി)

ടെബുകൊനാസോൾ 10% + സൾഫർ 65% ഡബ്ലിയുജി (വെള്ളത്തിൽ ചിതറുന്ന തരി) സംരക്ഷണം നൽകുന്നതും ഭേദകഫലമുള്ളതും നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതുമായ പ്രവർത്തനമുള്ള കാര്യക്ഷമമായ ഒരു കുമിൾനാശിനിയാണ്. ഇത് മുളകിലെ പൊടിപൂപ്പിലുള്ള പൂപടൽ, കായ ചീയൽ രോഗങ്ങൾ; സോയബീനിലെ ഇലപുള്ളി, തൊണ്ടു വാട്ട രോഗങ്ങൾ, മാവിലെ പൊടിപൂപ്പിലുള്ള പൂപടൽ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ഡോസ്:

വിള	രോഗത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	ലായനിയ്ക്ക് സ.ഘ. (ഗ്രാം/ലി.)	ലായനിയ്ക്ക് (മി.ലി.)	വെള്ളത്തിൽ നേർപിക്കൽ (ലി.)	അവസാന തളിപ്പ് മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരിപ്പ് സമയം (ദിവസം)
മുളക്	പൊടിപോലെയുള്ള പൂപടൽ, കായ ചീയൽ	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	5
മാവ്	പൊടിപൂപ്പിലുള്ള പൂപടൽ	0.15+ 0.975	1.5	1000	97
സോയബീൻ	ഇലപുള്ളി, തൊണ്ടുവാട്ടം	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	26

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശം:

ആവശ്യമായ അളവിൽ ഉല്പന്നം അളന്നെടുത്ത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ വെള്ളത്തിലൊഴിച്ചു അത് നന്നായി കുഴിക്കലർത്തുക. ഉചിതമായ സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ച് വിളയിലെത്തി പൂർണ്ണമായ വിധത്തിൽ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ട് എടുത്തുപാലത്തിലിരിക്കുന്ന അളവിലുള്ള അവശേഷിക്കുന്ന വെള്ളം ചേർക്കുക. സസ്യ സംരക്ഷണ ഉപകരണം: നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ, ഹാൻ്റ് സ്പ്രേയർ, കംപ്രഷൻ നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ, കംപ്രഷൻ നാപ്സാക് ബാറ്ററി സ്പ്രേയർ, ബാറ്ററി പൊണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പവർ സ്പ്രേയർ കൂടാതെ ASPEE-HTP പവർ സ്പ്രേയർ.

പ്രയോഗ സമയം: രോഗം ആദ്യമായി പ്രകടമാകുമ്പോൾ.

മുൻകരുതലുകൾ:

1. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യസാധനകണ്ടെയ്നറുകൾ, മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള തീറ്റ ഇവയിൽ നിന്ന് അകറ്റിവയ്ക്കുക.
2. ഉപയോഗിക്കുന്നയാൾ കാറ്റ്, നീണ്ട കുമ്പള്ള ഷർട്ട്, നീളൻ പാന്റ്, ഷൂസ് എന്നിവ പോലെ ഉചിതമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വേഷം ഉപയോഗിക്കണം.
3. ഈ ഉൽപന്നം കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണുകളും ചർമ്മവുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണം.
4. ഇത് ശ്വസിക്കരുത്.
5. പ്രയോഗസമയത്ത് തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ പുകവലിക്കുകയോ അരുത്.
6. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം.
7. ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്.
8. ലോബിലുള്ളശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും സോപ്പും വെള്ളവുമുപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ:

തലവേദന, തലകറക്കം, ദാരിദ്ര്യം, ഓക്കാനം, തൊണ്ട വേദന, നെഞ്ചു വേദന, ഉദരത്തിനു താഴെയുള്ള വേദന, കുമ്പ, കുടലിനു ചർമമത്തിനും ശ്ലേഷ്മ പാളികൾക്കും അസ്വസ്ഥതയ്ക്കു കാരണമായേക്കാം.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ:

കണ്ണിൽ തെറിച്ചുവീണാൽ ധാരാളം വെള്ളമുപയോഗിച്ചു കഴുകുക. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ബാധിതമായ ശരീരഭാഗങ്ങൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകുക. ഈ രാസവസ്തു ശ്വസിച്ചാൽ, ഇരയെ ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് മാറ്റുക. ശ്വസിക്കുന്നതിൽ വിഷമമനുഭവപ്പെട്ടാൽ കൃത്രിമശ്വാസം നൽകുക. അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വായിലൂടെ യാതൊന്നും നൽകരുത്. വൃക്തിക്ക് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളമുപയോഗിച്ച് കഴുകുക. ഛർദ്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. 1- 2 ഗ്രാസ് വെള്ള കുടിക്കാൻ രോഗിയെ അനുവദിക്കുക. ഉടൻ തന്നെ ഫിസിഷ്യനെവിളിക്കുക.

സസ്യവിഷങ്ങൾ:

ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വയലിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉൽപന്നം സസ്യവിഷങ്ങളുമുള്ളതല്ല.

മറ്റുമാണ്:

അറിയപെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മറ്റുമാണ്യങ്ങൾ ഇല്ല.

കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കൽ:

1. പരിസ്ഥിതിയോ വെള്ളമോ മലിനമാകാത്ത വിധം സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലായിരിക്കണം മിച്ചമുള്ള വസ്തുക്കളും പാക്കേജും യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ കഴുകിയ വെള്ളവും നശിപ്പിക്കുന്നത്.
2. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പാക്കറ്റുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് തടയാനായി അവ പുറത്തെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്.
3. പാക്കേജ് തകർത്ത് ആൾപാർപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് അകലെയായി കുഴിച്ചിട്ടുവേണം.

സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യൽ:

1. കളനാശിനികൾ അടഞ്ഞുള്ള പാക്കേജുകൾ പ്രണിനിരോധനിയുടെ അളവിനെയും സ്വഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ച് മറ്റ് വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറികൾ അഥവാ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെയായി പ്രത്യേക മുറികളിൽ അഥവാ പരിസരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക അലമാരകളിൽ അടച്ചുപൂട്ടി വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ.
2. കളനാശിനി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മുറികൾ അഥവാ പരിസരങ്ങൾ അവ നീരാവിയുമായി കലർന്ന് ഭക്ഷണമുണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഉറപ്പായി നിർമ്മിച്ചതും വരണ്ടതും നല്ല പ്രകാശമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും പരാപ്രഭാവ നീളവും വീതിയും ഉയരവുമുള്ളതും ആയിരിക്കണം.

രാസ ഘടന:

പൊളിഡൈഹൈഡ്രൈൽ സിലോക്സൈൻ	0.10% ഭാ/ഭാ
ടെബുകൊനാസോൾ സ.ഘ.	10.00% ഭാ/ഭാ
സൾഫർ സ.ഘ.	65.00% ഭാ/ഭാ
പൊട്ടാസ്യം പോളികാർബോക്സിലേറ്റ്	2.50% ഭാ/ഭാ
ഫൊസാൽസൾഫോണിക് ആസിഡ് ഫൊസാൽ	5.00% ഭാ/ഭാ
ഫോർമൽഡിഹൈഡ് യൂറിയ സാന്ദ്രീകരണം, സോഡിയം ലവണം	1.15% ഭാ/ഭാ
കാർബോക്സി മീഥൈൽ സെല്ലുലോസ്	5.50% ഭാ/ഭാ
ചിറക്കളിമണ്ണ്	QS %
ആകെ:	**100.00% ഭാ/ഭാ**

മുൻകരുതൽ: 1. ഈ ലേബലിൽ/ലഘുലേഖയിൽ എടുത്തുമാപ്പിക്കിരുന്നവ ഒഴികെ മറ്റ് വിളകളിൽ പ്രയോഗിക്കരുത്. 2. വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള പ്രയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത്. 3. ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം ലഘുലേഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കണം. 4. പോളി ഹൗസിനും അടച്ചുകെട്ടിയ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡോസേജും - ലഘുലേഖ കാണുക.

ടൗലഡോ-എസ്

ടെബുകൊണസോൾ 10 ശതം + സൾഫർ 65 ശതം ഡബ്ല്യൂ.ജി.
(അൻദർവ്യാപ മരിയാ സ്പർശ്യനീയ ശിലീന്ദ്രനാശിനി)

ടെബുകൊണസോൾ 10 ശതം + സൾഫർ 65 ശതം ഡബ്ല്യൂജി (ചിലിത് 80ന്റെ ഗിലലലാകട്ട പ്രയോഗത്തിനു ശിലീന്ദ്രനാശിനി. ഇത് രട്ടമിയിട്ടു, ഭീന്ന വിനാശം ചേർത്ത്, നിർമ്മിയിൽ (പ്രയോഗം ചുവടിപ്പുതാൾ. ഇത് മിരിട്ടു പലതും ഒരേസമയം ബാധ്യതയുടെ, പിടിയ മിരുട്ടു വ്യാമലവും: സോയാബീനിലെ ഇലപുള്ളി, തൊണ്ടു വാട്ട രോഗങ്ങൾ, മാവിലെ പൊടിയൂപ്പിലുള്ള പൂപടൽ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ഡോസ്:

വിള	രോഗത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	ലായനിയ്ക്ക് സ.ഘ. (ഗ്രാം/ ഹെ.)	ലായനിയ്ക്ക് (ഗ്രാം/ ഹെ.)	വെള്ളത്തിൽ നേർപിക്കൽ (ലി.)	അവസാന തളിപ്പ് മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരിപ്പ് സമയം (ദിവസം)
മുളക്	പൊടിപോലെയുള്ള പൂപടൽ, കായ ചീയൽ	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	5
മാവ്	പൊടിപൂപ്പിലുള്ള പൂപടൽ	0.15+ 0.975	1.5	1000	97
സോയബീൻ	ഇലപുള്ളി, തൊണ്ടുവാട്ടം	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	26

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശം:

ആവശ്യമായ അളവിൽ ഉല്പന്നം അളന്നെടുത്ത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ വെള്ളത്തിലൊഴിച്ചു അത് നന്നായി കുഴിക്കലർത്തുക. ഉചിതമായ സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ച് വിളയിലെത്തി പൂർണ്ണമായ വിധത്തിൽ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ട് എടുത്തുപാലത്തിലിരിക്കുന്ന അളവിലുള്ള അവശേഷിക്കുന്ന വെള്ളം ചേർക്കുക. സസ്യ സംരക്ഷണ ഉപകരണം: നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ, ഹാൻ്റ് സ്പ്രേയർ, കംപ്രഷൻ നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ, കംപ്രഷൻ നാപ്സാക് ബാറ്ററി സ്പ്രേയർ, ബാറ്ററി പൊണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പവർ സ്പ്രേയർ കൂടാതെ ASPEE-HTP പവർ സ്പ്രേയർ.

പ്രയോഗ സമയം: രോഗം ആദ്യമായി പ്രകടമാകുമ്പോൾ.

മുൻകരുതലുകൾ:

1. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യസാധനകണ്ടെയ്നറുകൾ, മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള തീറ്റ ഇവയിൽ നിന്ന് അകറ്റിവയ്ക്കുക.
2. ഉപയോഗിക്കുന്നയാൾ കാറ്റ്, നീണ്ട കുമ്പള്ള ഷർട്ട്, നീളൻ പാന്റ്, ഷൂസ് എന്നിവ പോലെ ഉചിതമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വേഷം ഉപയോഗിക്കണം.
3. ഈ ഉൽപന്നം കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണുകളും ചർമ്മവുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണം.
4. ഇത് ശ്വസിക്കരുത്.
5. പ്രയോഗസമയത്ത് തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ പുകവലിക്കുകയോ അരുത്.
6. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം.
7. ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്.
8. ലോബിലുള്ളശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും സോപ്പും വെള്ളവുമുപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ:

തലവേദന, തലകറക്കം, ദാരിദ്ര്യം, ഓക്കാനം, തൊണ്ട വേദന, നെഞ്ചു വേദന, ഉദരത്തിനു താഴെയുള്ള വേദന, കുമ്പ, കുടലിനു ചർമമത്തിനും ശ്ലേഷ്മ പാളികൾക്കും അസ്വസ്ഥതയ്ക്കു കാരണമായേക്കാം.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ:

കണ്ണിൽ തെറിച്ചുവീണാൽ ധാരാളം വെള്ളമുപയോഗിച്ചു കഴുകുക. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ബാധിതമായ ശരീരഭാഗങ്ങൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകുക. ഈ രാസവസ്തു ശ്വസിച്ചാൽ, ഇരയെ ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് മാറ്റുക. ശ്വസിക്കുന്നതിൽ വിഷമമനുഭവപ്പെട്ടാൽ കൃത്രിമശ്വാസം നൽകുക. അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വായിലൂടെ യാതൊന്നും നൽകരുത്. വൃക്തിക്ക് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളമുപയോഗിച്ച് കഴുകുക. ഛർദ്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. 1- 2 ഗ്രാസ് വെള്ള കുടിക്കാൻ രോഗിയെ അനുവദിക്കുക. ഉടൻ തന്നെ ഫിസിഷ്യനെവിളിക്കുക.

സസ്യവിഷങ്ങൾ:

ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വയലിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉൽപന്നം സസ്യവിഷങ്ങളുമുള്ളതല്ല.

മറ്റുമാണ്:

അറിയപെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മറ്റുമാണ്യങ്ങൾ ഇല്ല. ലക്ഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കൽ:

1. പരിസ്ഥിതിയോ വെള്ളമോ മലിനമാകാത്ത വിധം സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലായിരിക്കണം മിച്ചമുള്ള വസ്തുക്കളും പാക്കേജും യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ കഴുകിയ വെള്ളവും നശിപ്പിക്കുന്നത്.
2. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പാക്കറ്റുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് തടയാനായി അവ പുറത്തെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്.
3. പാക്കേജ് തകർത്ത് ആൾപാർപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് അകലെയായി കുഴിച്ചിട്ടുവേണം.

സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യൽ:

1. കളനാശിനികൾ അടഞ്ഞുള്ള പാക്കേജുകൾ പ്രണിനിരോധനിയുടെ അളവിനെയും സ്വഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ച് മറ്റ് വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറികൾ അഥവാ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെയായി പ്രത്യേക മുറികളിൽ അഥവാ പരിസരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക അലമാരകളിൽ അടച്ചുപൂട്ടി വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ.
2. കളനാശിനി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മുറികൾ അഥവാ പരിസരങ്ങൾ അവ നീരാവിയുമായി കലർന്ന് ഭക്ഷണമുണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഉറപ്പായി നിർമ്മിച്ചതും വരണ്ടതും നല്ല പ്രകാശമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും പരാപ്രഭാവ നീളവും വീതിയും ഉയരവുമുള്ളതും ആയിരിക്കണം.

രാസഘടന:

പോളിഡൈഹൈഡ്രൈൽ സിലോക്സൈൻ	0.10 ശതം ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
ടെബുകൊണസോൾ എ.ഐ.	10.00 ശതം ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
സൾഫർ എ.ഐ.	65.00 ശതം ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
പൊട്ടാസ്യം പോളിഅക്രിലേറ്റ്	2.50 ശതം ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
ഫിനോലിഫോർമൽ യൗഡ് ഫൈൽ ഫൊർമൽഡിഹൈഡ് യൂറിയാ കാൻഡെൻസ്ഡ്, എൻഎ ലവണം	5.00 ശതം ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
കാർബോക്സി മീഥൈൽ സെല്ലുലോസ്	1.15 ശതം ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
സിമിക്കാം ലിഗ്നോസൾഫോണേറ്റ്	5.50 ശതം ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
ചൈന ക്ലേ	Q.S. ശതം
മൊത്തം:	**100.00 ശതം ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ**

മുൻകരുതൽ: 1. ലേബൽ മരിയാ കവർപ്പായ ഡ്രൈസുലമിട്ടാ ചെലലാ മരിയാ അതേസ്സ് ഉപയോഗിക്കരുത്. 2. കീടങ്ങ കരുവേർ ഉപയോഗിക്കരുത്. 3. ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം ലഘുലേഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കണം. 4. പോളി ഹൗസിനും അടച്ചുകെട്ടിയ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡോസേജും - ലഘുലേഖ കാണുക.

ТОЛЕДО-ЕС

ТЕБУКОНАЗОЛ 10 % + СЕРА 65 % ВГ
(ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЕВОВ)

ТЕБУКОНАЗОЛ 10 % + СЕРА 65 % ВГ (ТЕКУЧАЯ ГРАНУЛЯТ) ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ ФУНГИЦИДОМ С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ, ОБЛАДАЮЩИМ ЗАЩИТНЫМ И ИСКОРЕНЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ. ЭТОТ ФУНГИЦИД ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ ПОРОШИСТОЙ РОСЫ ПЕРЦА, ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ И ГНИЛИ ПЛОДОВ; ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ СОИ, ГНИЛИ СТЕБЛЕЙ; ПОРОШИСТОЙ РОСЫ И ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ МАНГО.

ДОЗИРОВКИ:

ВИД	ОБЩЕПРИНЯТОЕ НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНИ	ДОЗИРОВКА ПРЕПАРАТА (Г/Л)	ДОЗИРОВКА ПРЕПАРАТА (МЛ/ГА)	ОБЪЕМ РАСТВОРА (ЛИТР/ГА)	ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ОБРАБОТКИ ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНЕЙ)
ПЕРЕЦ	ПОРОШИСТАЯ РОСА	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	5
МАНГО	ПОРОШИСТАЯ РОСА	0.15 + 0.975	1.5	1000	97
СОЯ	ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ И ГНИЛЬ СТЕБЛЕЙ	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	26

ПРИМЕНЕНИЕ:

ОТМЕРЬТЕ ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА. ДОБАВЬТЕ ЕГО В НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ И ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАЙТЕ. ДОБАВЬТЕ ОСТАВШУЮСЯ ВОДУ. ПРИ ПОМОЩИ ПОДХОДЯЩЕГО ОПРЫСКИВАТЕЛЯ ОБЕСПЕЧЬТЕ ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОСЕВОВ. ОПРЫСКИВАТЕЛИ: РУЧНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ, ОПРЫСКИВАТЕЛИ С СЖАТИЕМ, ОПРЫСКИВАТЕЛИ С АККУМУЛЯТОРНЫМ ПИТАНИЕМ, ПЛЮС ПОРТАТИВНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ASPEE-HTP.

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ:

ОБРАБАТЫВАЙТЕ ПРИ ПЕРВОМ ПРОЯВЛЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. ХРАНИТЕ ВДАЛИ ОТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПОСУДЫ ДЛЯ ПИЩИ, КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ.
2. ОПЫЛИВАЙТЕСЬ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ИМЕЕТ ПРАВО ОБРАЩАТЬСЯ С ПЕСТИЦИДАМИ.
3. ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПРЕПАРАТА В ГЛАЗА И НА КОЖУ.
4. ИЗБЕГАЙТЕ ВДЫХАНИЯ ПРЕПАРАТА.
5. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА НЕ ЕШЬТЕ, НЕ ПЬТЕ И НЕ КУРИТЕ.
6. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ПРЕПАРАТОМ ВЫМОЙТЕСЬ ПОЛНОСТЬЮ С МЫЛОМ И ВОДОЙ.
7. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ПРЕПАРАТОМ ВЫСТИРАЙТЕ ОДЕЖДУ ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГОЙ ОДЕЖДЫ.
8. ПУСТЫЕ ТАРЫ ПРЕПАРАТА ПОЛНОСТЬЮ ОПОЛОСНИТЕ ВОДОЙ И ЗАКОПАЙТЕ ИЛИ СЖИГАЙТЕ ВДАЛИ ОТ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

ПРИ ПОПАДАНИИ ПРЕПАРАТА В ГЛАЗА ПРОМОЙТЕ ИХ ОБИЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ. ПРИ ПОПАДАНИИ ПРЕПАРАТА НА КОЖУ ОБМОЙТЕСЬ ОБИЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ С МЫЛОМ. ПРИ ВДЫХАНИИ ПРЕПАРАТА ВЫНЕСИТЕ ПОСТРАДАВШЕГО ИЗ ЗОНЫ ЗАРАЖЕНИЯ. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ ПРЕПАРАТА ВЫЗОВИТЕ РВОТУ. ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТ НЕ ОБЛАДАЕТ ФИТОТОКСИЧНОСТЬЮ.

ПРОТИВОЯДИЕ:

НЕТ ПРОТИВОЯДИЯ. ЛЕЧИТЕ СИМПТОМАТИЧЕСКИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

ПРЕПАРАТ ОПАСЕН ДЛЯ ПТИЦ И ПЧЕЛ. ОПАСЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ. ОПАСЕН ДЛЯ ПОЛЕЗНЫХ НАСЕКОМЫХ. ОПАСЕН ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА:

ОПАСЕН ПРИ ВДЫХАНИИ. ОПАСЕН ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА. ОПАСЕН ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. ОПАСЕН ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ:

ОПАСЕН ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ:

ПРЕПАРАТ ОПАСЕН ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОЧВЫ:

ПРЕПАРАТ ОПАСЕН ДЛЯ ПОЧВЫ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОСЕВОВ:

ПРЕПАРАТ ОПАСЕН ДЛЯ ПОСЕВОВ