

Label 1Ltr (Size: 282mm x 140mm)

282mm

12mm

12mm

V-MYCIN™

Validamycin 3% L
(Systemic Antibiotic)

Chemical Composition: Validamycin AL.: 3.000% w/w, Polyoxy ethylene nonyl phenyl ether (NP-85): 2.000% w/w, Silicone-KM-72: 0.010% w/w, Potassium Sorbate: 0.050% w/w, Acid green dye: 0.010% w/w, Water: QS to make 100, Total: 100.000% w/w. **Direction of Use:** P.P. Equipment: Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery and ASPEE-HTP power sprayer etc. Validamycin is compatible with most common insecticides. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat Symptomatically. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Headache, giddiness, nausea, vomiting and anxiety may occur. **Recommendations:** It is an antibiotic for the control of rice sheath blight only. **Warning:** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

वि-माइसिन

वालीडामाईसिन ३% तरल
(अंतःप्रवाही प्रतिजैविक)

रासायनिक संघटना: वालीडामाईसिन सक्रिय तत्व: ३.०००% भा/भा, पोलिऑक्सी ईथाईलीन नोनिल फेनिल ईथर (एच.पी.-८५): २.०००% भा/भा, सिलिकोन के.एम.७२: ०.०१०% भा/भा, पोटैशियम सोर्बेट: ०.०५०% भा/भा, एसिड ग्रीन डाय: ०.०१०% भा/भा, पानी: शेष मात्रा, योग: १००.०००% भा/भा। **उपयोग के लिये निर्देश:** पीप सुखा क्षेत्र: पीप पर लाद कर डिब्बकव करने वाला क्षेत्र पर से चलने वाला डिब्बकव क्षेत्र, पीप पर लाद कर दबाव से चलने वाला डिब्बकव क्षेत्र ए. एस. पी. ई. ई-एच.टी.पी. शक्ति चालित डिब्बकव क्षेत्र आदि। संयोजन - अधिकोश सामान्य उपयोग में आने वाले कीटनाशक के साथ मिला कर प्रयोग किया जा सकता है। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचावें। ३. डिब्बकव की वायु को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। हवा की दिशा में डिब्बकव करें। ४. डिब्बकव के बाद दूधित कराई और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. डिब्बकव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चन्चान नहीं चाहिए। ६. डिब्बकव करते वक़्त मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कार्य करें। **विषयाशयक:** कोई विशिष्ट विषयाशयक नहीं है। **सुरक्षासूचनाएँ:** इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे मुतुटी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकलता पदार्थ साफ़ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कराई और त्वचा दूधित हो जाए तो दूधित कराई उतार दें और त्वचा काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूधित हो जायें तो उनको काफ़ी मात्रा में तैलरान/साफ़ पानी से लगाना १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **लक्षण:** सिरदर्द, ज्वर आना, भिन्ती, उल्टी, पचनार्हत हो सकते हैं। **उपयोग:** केवल धान पर अच्छर अंगमारी रोग के निवृत्त के लिये प्रभावकारी प्रतिजैविक है। **पैकेजिंग:** १) लेबल और सुचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलगाव अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें। २) फसल कराई के बाद के कर्मों के लिए इस्तेमाल ना करें। ३) फसल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटैनर नष्ट करें। ४) पत्नी हाइस और बंद इलाक़ और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए - पत्रक देखें।

वि-माइसिन

वालीडामाईसिन ३% ओल
(अंतःप्रवाही प्रतिजैविक)

रासायनिक संघटना: वालीडामाईसिन सक्रिय तत्व: 3.000% भार/भार, पोलिऑक्सी ईथाईलीन नोनिल फेनिल ईथर (ओ.पी.-८५): 2.000% भार/भार, सिलिकोन के.एम.-72: 0.010% भार/भार, पोटैशियम सोर्बेट: 0.050% भार/भार, एसिड ग्रीन डाय: 0.010% भार/भार, पाणी: शेष मात्रा, कुल: 100.000% भार/भार. **उपयोग मॉडेल निर्देश:** छोड़ सुखा उपकरण: नेप्येड स्प्रैयर, बूट स्प्रैयर, कोम्पेन नेप्येड स्प्रैयर, कोम्पेन नेप्येड नेट्टी अने अस्प्री-अस्प्री पावर स्प्रैयर. वैलिडामाईसिनको (उपयोग सामान्य रीते पर) धान में आयात मोटाभागा में चतुर्नाशकाली साथी मिलावटी करी राखा है. **वापनार माटे सावधानी:** 1. जाध पहाडी, जाध सामग्रीला वाली घासोको अने पशुओला सावधी दूर राखो. 2. मुज, त्वचा अने आंखे ला संपर्कशी नखाओ. 3. छंटावला क्वास मां जवाधी नखाओ. 4. छंटावला पाणी दूधित क्वास अने माडीले छोड नाओ. 5. छंटावला वकते, जावा पीपान्को, तंवाड-नीडी सोनरेट पीपान्को बंध करो. 6. वापरनारे संपूर्णपणे सुरक्षात्मक कर्मां घेरेवा शोडोणे. हवाली दिशा मां छंटावला करो. **विषयाशयक:** कोई विषयाशयक न्हायें। **लक्षण:** मुजून सावयर करो. **प्राथमिक सावयर:** 1. जो गली जवायो तो गगला पाखला भागमां गलगदिया करीले डेवटी करो. (डेट्टी द्वारा साह मां धाव त्यां सुधी तेले पुनरावर्तन करो. जो दट्टी नोबान होय तो (डेट्टी न करावो. डोस्टरनी मट्ट लो. 2. जो क्वास अने यामडी दूधित होय तो क्वास दूर करो अने दूधित त्वर्याने साबुन अने पाणीशी धुओ. 3. जो आंखो दूधित थाय छे, तो लगनला 10 थो 15 मिनट माटे स्प्येस पाणीशी पुखण इलास करो. 4. जो सास तेलामां आवे, तो दट्टीले ताजु हवामां राखो. ३. रोजाना **लसाओ:** माथामां दुधावो, सडर आसवा, उलाड, उलटी अने गलभट वगैरे धाई राखे छे. **उपयोग:** मात्रा डंगरना पाडमां शीथ लोस्टाटला रोगमां अंडुबा मटे अस्वराडर अँटीबायोटिड छे. **सावधानीनु निर्देश:** 1. लेबल अने पत्रको पर (क्षेत्रित सिंघाया पाड अने शतुओ पर (उपयोग नहीं करो. 2. लाटाली पखत छंटावला माटे (उपयोग नहीं करो शोडोणे. 3. (उपयोग पछी डवला पत्रकमां निर्देश अनुसर नावा करो. 4. पोली हाइस अने बंधियार क्वासा माटे निर्देश अने मात्रा - पत्रक बुको.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।


वि-माइसिन वि - माइसिन

V-MYCIN™

Validamycin 3% L

वि-माइसिन

वालीडामाईसिन ३% तरल



FUNGICIDE
फफूंदीनाशक

Net Content 1 Ltr.
शुद्ध मात्रा १ ली.



Regn. No. : CIR-229487/2022-Validamycin (L) (442)-613
पंजी. नं. / रजि.नं.: सीआयआर-२२९४८७/२०२२-वालीडामाईसिन (एल) (४४२)-६१३
Mfg. Lic No. : ML/JDPPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / व.ला.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By: M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanageri Marg, Kalina, Santacruz (E),
behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता एवं विपणनकर्ता: मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कामलवाला हाऊस,
दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांतक्रुज (पू.), बिहाइंड होंडा शोरूम, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८.
Factory: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli,
Dist.-Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी: जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली,
जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत.

Batch No. / बैच नं. / वेच नं.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि:
उत्पादन तारीख:
Exp. Date / समापन तिथि:
अवधि समाप्ति तारीख:
Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹:
सभी करों सहित
वधुमां वधु शिखर किंमत ₹:
इस्तेमाल साथी
Unit Sale price per ml

Net Content : 1 Ltr. शुद्ध मात्रा : १ ली.

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office
address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

SHAKE WELL BEFORE USE TM - Trademark

Read enclosed leaflet before use. Re-entry: 24 hours

QR Code
18 x 18 mm

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।
उपयोग थी पहले संलग्न पत्रिका वांचो.
For agriculture use only. कृषि उपयोग के लिए।



PANTONE 5473 C PANTONE 110 C

